

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg「ツルハラ」
生物学的同等性に関する資料

鶴原製薬株式会社

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「ツルハラ」と標準製剤との血中濃度比較による検討

1. 緒言

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「ツルハラ」と標準製剤との生物学的同等性を検討するため、両製剤投与後の血漿中イフェンプロジル酒石酸塩の濃度推移を比較した。

2. 実験方法

(1) 使用薬剤

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「ツルハラ」

標準製剤

(2) 対象

あらかじめ健康診断を実施し、異常の認められなかった成人男子 14 名

(3) 投与量

製剤試験により同等と認められた両製剤 4 錠（イフェンプロジル酒石酸塩 40mg）を
経口投与した。

(4) 投与方法


(5) 健康成人男子志願者で事前に文書による同意を得られた 14 名をクロスオーバー法
によって 2 群に分け、医師の問診の後、1 群にはイフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg
「ツルハラ」、他群には標準製剤を朝食後経口投与した。休薬期は 2 週間とした。

(6) 採血時間

投与前、20 分、40 分、1 時間、1.5 時間、2 時間、3 時間、5 時間、8 時間

3. 結果

得られた薬物動態パラメータ（AUC、C_{max}）について 90%信頼区間法にて統計解析を行
った結果、 $\log(0.8) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。



(Mean ± S.E., n=14)

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC0-8 (ng · hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t1/2 (hr)
イフェンプロジル 酒石酸塩錠 10mg 「ツルハラ」	112.3 ± 11.1	47.7 ± 4.4	1.3 ± 0.1	1.2 ± 0.1
標準製剤 (錠剤、10mg)	119.7 ± 13.6	50.7 ± 5.6	1.2 ± 0.1	1.2 ± 0.1

(Mean ± S.E., n=14)

血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。