

2007年9月

鶴原製薬株式会社

## ジアイナミックス注射液 使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、ジアイナミックス注射液の使用上の注意を下記のとおり自社改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

「適用上の注意」の項を下記のとおり改訂致します

改 訂 後	改 訂 前
(5) 適用上の注意 1) 調製時：本剤は、 <u>アミノ酸製剤と混合した場合、ビタミンの分解が促進されることがあるので注意すること。</u> 2) 注射速度：静脈内投与により血管痛を起こすことがあるので、注射速度はできるだけ遅くすること。 3) アンブルカット時：ワンポイントアンブルには小さな傷の位置を示すため丸印のマークをつけてあるので、アンブルカット直前にエタノールなどでよくふいたのち丸印マークを上にして両側にひっぱるように下に折り曲げ、カットする。(ヤスリは不要である。)	(5) 適用上の注意 1) 注射速度：静脈内投与により血管痛を起こすことがあるので、注射速度はできるだけ遅くすること。 2) アンブルカット時：ワンポイントアンブルには小さな傷の位置を示すため丸印のマークをつけてあるので、アンブルカット直前にエタノールなどでよくふいたのち丸印マークを上にして両側にひっぱるように下に折り曲げ、カットする。(ヤスリは不要である。)

以上