

2010年4月

鶴原製薬株式会社

## コンスーベン内用液 0.75% 使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、コンスーベン内用液 0.75% の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

- ◆ 「(3) 相互作用の2) 併用注意」の項を下記のとおり改訂致します。(下線部追加箇所)

改 訂 後	改 訂 前																		
<p>(3) 副作用 2) その他の副作用 以下のような副作用があらわれた場合には投与を中止する等、適切な処置を行うこと。</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻 度 不 明</th></tr></thead><tbody><tr><td>消化器</td><td>腹痛、悪心、嘔吐、腹鳴、腹部膨満感、下痢、腹部不快感 等</td></tr><tr><td>皮 膚</td><td>蕁麻疹、発疹 等</td></tr><tr><td>肝 臓</td><td>AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇 等</td></tr><tr><td>精 神 神 経 系</td><td><u>めまい注)、一過性の意識消失注)</u></td></tr></tbody></table> <p>注) <u>大腸検査前処置に用いた場合、排便や腹痛による血管迷走神経反射に伴い症状があらわれることがある。</u></p>		頻 度 不 明	消化器	腹痛、悪心、嘔吐、腹鳴、腹部膨満感、下痢、腹部不快感 等	皮 膚	蕁麻疹、発疹 等	肝 臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇 等	精 神 神 経 系	<u>めまい注)、一過性の意識消失注)</u>	<p>(3) 副作用 2) その他の副作用 以下のような副作用があらわれた場合には投与を中止する等、適切な処置を行うこと。</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻 度 不 明</th></tr></thead><tbody><tr><td>消化器</td><td>腹痛、悪心、嘔吐、腹鳴、腹部膨満感、下痢、腹部不快感 等</td></tr><tr><td>皮 膚</td><td>蕁麻疹、発疹 等</td></tr><tr><td>肝 臓</td><td>AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇 等</td></tr></tbody></table>		頻 度 不 明	消化器	腹痛、悪心、嘔吐、腹鳴、腹部膨満感、下痢、腹部不快感 等	皮 膚	蕁麻疹、発疹 等	肝 臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇 等
	頻 度 不 明																		
消化器	腹痛、悪心、嘔吐、腹鳴、腹部膨満感、下痢、腹部不快感 等																		
皮 膚	蕁麻疹、発疹 等																		
肝 臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇 等																		
精 神 神 経 系	<u>めまい注)、一過性の意識消失注)</u>																		
	頻 度 不 明																		
消化器	腹痛、悪心、嘔吐、腹鳴、腹部膨満感、下痢、腹部不快感 等																		
皮 膚	蕁麻疹、発疹 等																		
肝 臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇 等																		

以 上