

アテネラートL錠 20mg 使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、アテネラートL錠 20mg の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。
今後のご使用に際しましては、新しい【使用上の注意】をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 「(4) 副作用2) その他の副作用」の項を下記のとおり改訂致します。(下線部追加箇所)

改 訂 後		改 訂 前	
2) その他の副作用		2) その他の副作用	
肝臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、Al-P 上昇、黄疸	肝臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、Al-P 上昇、黄疸
腎臓	BUN 上昇、クレアチニン上昇	腎臓	BUN 上昇、クレアチニン上昇
循環器	顔面潮紅、熱感、のぼせ、潮紅、動悸、血压低下、起立性低血压、浮腫(下肢、顔面等)、胸部痛、頻脈、頻尿、発汗、悪寒	循環器	顔面潮紅、熱感、のぼせ、潮紅、動悸、血压低下、起立性低血压、浮腫(下肢、顔面等)、胸部痛、頻脈、頻尿、発汗、悪寒
精神神経系	頭痛、めまい、倦怠感、眠気、不眠、脱力感、筋痙攣、四肢しびれ感、異常感覚、振戦	精神神経系	頭痛、めまい、倦怠感、眠気、不眠、脱力感、筋痙攣、四肢しびれ感、振戦
消化器	恶心・嘔吐、便秘、 上腹部痛 、下痢、腹部不快感、口渴、胸やけ、食欲不振、 <u>鼓腸</u>	消化器	恶心・嘔吐、便秘、 上腹部痛 、下痢、腹部不快感、口渴、胸やけ、食欲不振
過敏症	発疹、瘙痒、光線過敏症、紫斑、血管浮腫	過敏症	発疹、瘙痒、光線過敏症、紫斑
口腔	歯肉肥厚	口腔	歯肉肥厚
代謝異常	高血糖	代謝異常	高血糖
血液	血小板減少、貧血、白血球減少	血液	血小板減少、貧血
呼吸器	呼吸困難、咳嗽、鼻出血、鼻閉	呼吸器	呼吸困難、咳嗽
その他	女性化乳房、視力異常(霧視等)、眼痛、筋肉痛、関節痛、関節腫脹、勃起不全	その他	女性化乳房、視力異常(霧視等)、筋肉痛、関節痛、勃起不全

◆ 「(10) その他の注意」の項を削除致します。

改 訂 後		改 訂 前	
【項目削除】		(10) その他の注意 シサブリドとの併用により、本剤の血中濃度が上昇したとの報告がある。	

以上