鶴原製薬株式会社

ラクデーン錠 25mg 使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品であるラクデーン錠 25mg の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。 今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

▶「(3)副作用の2)併用注意」の項を下記のとおり改訂致します。(下線部追加箇所)

改	訂	後	改	訂	前
3) 相互作用 2) 併用注意(併用に注意すること)			(3) 相互作用 (2) 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状·措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状·措置方法	機序・危険因子
	ことがあるので、用量 を調節するなど注意	これらの薬剤と本剤の 相加・相乗作用		降圧作用を増強する ことがあるので、用量 を調節するなど注意 する。	
ルコン酸カリウ	発することがあるので、血清カリウム値を観察するなど十分注意する。		ルコン酸カリウ		相加・相乗作用による 清カリウム値の上昇。
ノルアドレナリン	血管反応性を低下さ	本剤が心血管反応性を 低下させる機序は完全 には解明されていない。 危険因子:麻酔施行患者	ノルアドレナリン	ノルアドレナリンの 血管反応性を低下さ せるとの報告がある。	低下させる機序は完
乳酸ナトリウム	することがある。	本剤により高カリウム 性アシドーシスが惹起 され、乳酸ナトリウムの アルカリ化作用と拮抗 する可能性がある。	乳酸ナトリウム	することがある。	本剤により高カリウ性アシドーシスが惹され、乳酸ナトリウムアルカリ化作用と拮する可能性がある。
塩化アンモニウム コレスチラミン		これらの薬剤と本剤の 相加・相乗作用	塩化アンモニウム コレスチラミン	代謝性アシドーシスを 来すとの報告がある。	これらの薬剤と本剤 相加・相乗作用
ジゴキシン メチルジゴキシン	メチルジゴキシン濃	本剤がジゴキシン及びメ チルジゴキシンの腎から の排泄を低下させるため、血中ジゴキシン及び メチルジゴキシン濃度 を上昇させることがある。	ジゴキシン メチルジゴキシン	血中ジゴキシン及びメチルジゴキシン及び メチルジゴキシン濃 度が上昇することが ある。	チルジゴキシンの腎か
ジギトキシン	を増強又は減弱する おそれがあるので、併 用する場合にはジギ トキシンの血中濃度 の測定を行うなど、観	本剤の肝酵素誘導によりジギトキシンの血中 濃度半減期が短縮する と考えられる報告がある。また、機序は不明で あるが、ジギトキシンの 血中濃度半減期が延長 したとの報告がある。	ジギトキシン	を増強又は減弱する おそれがあるので、併 用する場合にはジギ トキシンの血中濃度 の測定を行うなど、観	本剤の肝酵素誘導に りジギトキシンの血 濃度半減期が短縮す と考えられる報告が る。また、機序は不明 あるが、ジギトキシン 血中濃度半減期が延 したとの報告がある。