

2011年4月

鶴原製薬株式会社

マゴチフェンカプセル 1mg
マゴチフェンドライシロップ 0.1% 使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、平成23年4月20日付厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知（薬食安発0420第1号）の指示及び自主改訂により、弊社製品であるマゴチフェンカプセル 1mg、マゴチフェンドライシロップ 0.1%の使用上の注意を下記のとおり改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

◆「禁忌」の項に下記を追加致します。（_____部：薬食安通知、_____部：自主改訂）

改 訂 後	改 訂 前
【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 (1) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 (2) てんかん又はその既往歴のある患者〔 <u>痙攣閾値を低下させることがある。</u> 〕	【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

◆「(1) 慎重投与」の項を下記のとおり改訂致します。

（_____部：薬食安通知、_____部：自主改訂、_____部：削除）

改 訂 後	改 訂 前
(1) 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） てんかんを <u>除く</u> 痙攣性疾患、又はこれらの既往歴のある患者〔痙攣閾値を低下させることがある。〕（ 【禁忌】 の項参照）	(1) 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） てんかん <u>等</u> の痙攣性疾患、又はこれらの既往歴のある患者〔痙攣閾値を低下させることがある。〕

以 上