

2011年8月

鶴原製薬株式会社

ブスフォリロン錠 10mg 使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品であるブスフォリロン錠 10mg の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- ◆ 「(4) 副作用の2) その他の副作用」の項を下記のとおり改訂致します。(_____部改訂箇所)

改 訂 後	改 訂 前																												
2) その他の副作用 以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。	2) その他の副作用 以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。																												
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻 度 不 明</th></tr></thead><tbody><tr><td>眼</td><td>調節障害、<u>散瞳、閉塞隅角緑内障</u></td></tr><tr><td>消化器</td><td>口渇、腹部膨満感、鼓腸、便秘</td></tr><tr><td>泌尿器</td><td>排尿障害</td></tr><tr><td>精神神経系</td><td>頭痛、頭重感</td></tr><tr><td>循環器</td><td>心悸亢進</td></tr><tr><td>過敏症^{注)}</td><td>発疹、蕁麻疹、紅斑、そう痒症</td></tr></tbody></table>		頻 度 不 明	眼	調節障害、 <u>散瞳、閉塞隅角緑内障</u>	消化器	口渇、腹部膨満感、鼓腸、便秘	泌尿器	排尿障害	精神神経系	頭痛、頭重感	循環器	心悸亢進	過敏症 ^{注)}	発疹、蕁麻疹、紅斑、そう痒症	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻 度 不 明</th></tr></thead><tbody><tr><td>眼</td><td>調節障害</td></tr><tr><td>消化器</td><td>口渇、腹部膨満感、鼓腸、便秘</td></tr><tr><td>泌尿器</td><td>排尿障害</td></tr><tr><td>精神神経系</td><td>頭痛、頭重感</td></tr><tr><td>循環器</td><td>心悸亢進</td></tr><tr><td>過敏症^{注)}</td><td>発疹</td></tr></tbody></table>		頻 度 不 明	眼	調節障害	消化器	口渇、腹部膨満感、鼓腸、便秘	泌尿器	排尿障害	精神神経系	頭痛、頭重感	循環器	心悸亢進	過敏症 ^{注)}	発疹
	頻 度 不 明																												
眼	調節障害、 <u>散瞳、閉塞隅角緑内障</u>																												
消化器	口渇、腹部膨満感、鼓腸、便秘																												
泌尿器	排尿障害																												
精神神経系	頭痛、頭重感																												
循環器	心悸亢進																												
過敏症 ^{注)}	発疹、蕁麻疹、紅斑、そう痒症																												
	頻 度 不 明																												
眼	調節障害																												
消化器	口渇、腹部膨満感、鼓腸、便秘																												
泌尿器	排尿障害																												
精神神経系	頭痛、頭重感																												
循環器	心悸亢進																												
過敏症 ^{注)}	発疹																												
注) このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。	注) このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。																												

以 上