

ピタバスタチン Ca 錠 1mg 「ツルハラ」  
 ピタバスタチン Ca 錠 2mg 「ツルハラ」 用法・用量変更のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、新発売のピタバスタチン Ca 錠 1mg 「ツルハラ」・ピタバスタチン Ca 錠 2mg 「ツルハラ」について、平成 25 年 11 月 29 日付にて「用法・用量」の一部変更が下記のとおり承認されております。

ピタバスタチン Ca 錠 1mg 「ツルハラ」、ピタバスタチン Ca 錠 2mg 「ツルハラ」については、新発売時より改訂後の「用法・用量」を記載した添付文書を封入した製品を出荷致しますが、パンフレット・製剤見本には改訂前の「用法・用量」が記載されておりますので、下記の新しい「用法・用量」をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

	変 更 後	変 更 前 ( <input type="checkbox"/> 部削除)
効能・効果	高コレステロール血症 家族性高コレステロール血症	高コレステロール血症 家族性高コレステロール血症
用法・用量	通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1~2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。	通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1~2mgを1日1回 <input type="checkbox"/> 夕食 <input type="checkbox"/> 後に経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。

以 上