

アテネジン錠50mg・アテネジン錠100mg・アテネジン細粒10% 適正使用のお願い

2015年12月
鶴原製薬株式会社

拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、今冬もインフルエンザの流行時期を迎えておりますが、抗インフルエンザ薬の服用後に因果関係は不明ではあるものの、異常行動等の精神神経症状を発現した症例が報告されております。

小児・未成年者につきましては、異常行動による転落等の万が一の事故を防止するため予防的な対応として、患者様・ご家族に対して以下の点をご説明くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

本剤による治療が開始された後は

- ① “異常行動” の発現のおそれがあること。
- ② 自宅において療養を行う場合、少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮すること。

なお、インフルエンザ脳症等によっても、同様の症状があらわれるとの報告があるので、上記と同様の配慮が必要であることをご説明ください。

なお、厚生労働省のホームページに「平成27年度 今冬のインフルエンザ総合対策専用サイト」が開設されておりますので、併せてご参照頂きますようお願い申し上げます。

敬具

平成27年度 今冬のインフルエンザ総合対策について

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html>

平成27年度インフルエンザ Q&A

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>