

2017年1月

鶴原製薬株式会社

## チザニジン錠 1mg「ツルハラ」使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品であるチザニジン錠 1mg「ツルハラ」の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

◆「副作用の2) その他の副作用」の項を下記のとおり改訂致します。( \_\_\_\_\_部追加)

改 訂 後		現 行	
2) その他の副作用		2) その他の副作用	
	頻 度 不 明		頻 度 不 明
循 環 器	血圧低下、徐脈、動悸、失神	循 環 器	血圧低下、徐脈、動悸、失神
精神神経系	眠気、頭痛・頭重感、めまい（回転性めまい、浮動性めまい）・ふらつき、知覚異常（しびれ感等）、構音障害（ろれつがまわらない等）、不眠、幻覚、錯乱	精神神経系	眠気、頭痛・頭重感、めまい（回転性めまい、浮動性めまい）・ふらつき、知覚異常（しびれ感等）、構音障害（ろれつがまわらない等）、不眠、幻覚、錯乱
消 化 器	口渇、悪心、食欲不振、胃部不快感、腹痛、下痢、胃もたれ、便秘、口内炎、舌のあれ、口中苦味感、流涎	消 化 器	口渇、悪心、食欲不振、胃部不快感、腹痛、下痢、胃もたれ、便秘、口内炎、舌のあれ、口中苦味感、流涎
肝 臓	AST(GOT)の上昇、ALT(GPT)の上昇、Al-Pの上昇	肝 臓	AST(GOT)の上昇、ALT(GPT)の上昇、Al-Pの上昇
過 敏 症 <sup>注)</sup>	発疹、皮膚掻痒感、 <u>蕁麻疹、紅斑、血管性浮腫</u>	過 敏 症 <sup>注)</sup>	発疹、皮膚掻痒感
そ の 他	脱力・倦怠感、浮腫、尿閉、霧視、眼瞼下垂	そ の 他	脱力・倦怠感、浮腫、尿閉、霧視、眼瞼下垂
注) このような場合には投与を中止すること。		注) このような場合には投与を中止すること。	

以上