

2019年9月
鶴原製薬株式会社

トリクロルメチアジド錠2mg「ツルハラ」使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品であるトリクロルメチアジド錠2mg「ツルハラ」の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

◆【禁忌】の項に（5）として下記を追記致します。（_____部追加箇所）

改訂後	現行
(1) 無尿の患者〔本剤の効果が期待できない。〕 (2) 急性腎不全の患者〔腎機能を更に悪化させるおそれがある。〕 (3) 体液中のナトリウム、カリウムが明らかに減少している患者〔低ナトリウム血症、低カリウム血症等の電解質失調を悪化させるおそれがある。〕 (4) チアジド系薬剤又はその類似化合物(例えばクロルタリドン等のスルホンアミド誘導体)に対する過敏症の既往歴のある患者 (5) デスマプレシン酢酸塩水和物(男性における夜間多尿による夜間頻尿)を投与中の患者(「相互作用」の項参照)	(1) 無尿の患者〔本剤の効果が期待できない。〕 (2) 急性腎不全の患者〔腎機能を更に悪化させるおそれがある。〕 (3) 体液中のナトリウム、カリウムが明らかに減少している患者〔低ナトリウム血症、低カリウム血症等の電解質失調を悪化させるおそれがある。〕 (4) チアジド系薬剤又はその類似化合物(例えばクロルタリドン等のスルホンアミド誘導体)に対する過敏症の既往歴のある患者 【現行記載なし】

◆「併用禁忌」の項を新設し下記を追記致します。（_____部追加箇所）

改訂後			現行
1) 併用禁忌（併用しないこと）			【現行記載なし】
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
デスマプレシン酢酸塩水和物 ミニリンメルト (男性における夜間多尿による夜間頻尿)	低ナトリウム血症が発現するおそれがある。	いずれも低ナトリウム血症が発現するおそれがある。	

以上