

製品別比較表

2020年4月改訂

製品名	アマンタジン塩酸塩錠 50 mg 「ツルハラ」	標準品
販売会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	5.9 円/錠	13.6 円/錠
薬効分類名	抗A型インフルエンザウイルス剤/625、精神神経用剤/117、抗パーキンソン剤/116	
組成	1 錠中アマンタジン塩酸塩 50mg 含有	
性状	白～微黄白色のフィルムコーティング錠 識別記号は 010 である。 直径：約 6.5mm 厚さ：約 3.9mm 質量：約 110mg	白色のフィルムコート錠 直径：約 7.1mm 厚さ：約 3.3mm 質量：約 0.12g
添加物	乳糖水和物、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール 6000、カルナウバロウ	セルロース、ポビドン、第三リン酸カルシウム、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> ・脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善 ・パーキンソン症候群 ・A型インフルエンザウイルス感染症 	
用法・用量	<ul style="list-style-type: none"> ・脳梗塞後遺症の場合 通常、成人にはアマンタジン塩酸塩として1日 100～150mg を2～3回に分割経口投与する。なお、症状、年齢に応じて適宜増減する。 ・パーキンソン症候群の場合 通常、成人にはアマンタジン塩酸塩として初期量1日 100mg を1～2回に分割経口投与し、1週間後に維持量として1日 200mg を2回に分割経口投与する。なお、症状、年齢に応じて適宜増減できるが、1日 300mg 3回分割経口投与までとする。 ・A型インフルエンザウイルス感染症の場合 通常、成人にはアマンタジン塩酸塩として1日 100mg を1～2回に分割経口投与する。なお、症状、年齢に応じて適宜増減する。ただし、高齢者及び腎障害のある患者では投与量の上限を1日 100mg とすること。 	

標準製剤との同等性

試験液：水、回転率：毎分 50 回転、第 2 法
規定時間：30 分、溶出率：85%以上
(オレンジブック No. 11 掲載)
両製剤の溶出挙動は同等であった。

