







製品別比較表

2020年4月改訂

商品名	アトルバスタチン錠 5mg 「TSU」	標準品
会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	15.0円/錠	42.7円/錠
薬効分類名	HMG-CoA 還元酵素阻害剤	
組成	1錠中アトルバスタチンカルシウム水和物 5.42mg (アトルバスタチンとして 5mg) 含有	
性状	ごくうすい紅色のフィルムコーティング錠で、識別記号は表面 A58、裏面 5 である 直径：5.6mm 厚さ：2.7mm 質量：68mg 	白色のフィルムコーティング錠 直径：5.6mm, 厚さ：2.7mm, 質量：72mg
添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリソルベート 80、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、酸化チタン、タルク、三二酸化鉄、その他 1 成分	乳糖水和物、結晶セルロース、沈降炭酸カルシウム、クロスカルメロースナトリウム、ポリソルベート 80、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、三二酸化鉄
効能・効果	高コレステロール血症 家族性高コレステロール血症	
用法・用量	<ul style="list-style-type: none"> ・高コレステロール血症 通常、成人にはアトルバスタチンとして 10mg を 1 日 1 回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減するが、重症の場合は 1 日 20mg まで増量できる。 ・家族性高コレステロール血症 通常、成人にはアトルバスタチンとして 10mg を 1 日 1 回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減するが、重症の場合は 1 日 40mg まで増量できる。 	
溶出挙動	アトルバスタチン錠 5mg 「TSU」につき、標準製剤 (アトルバスタチン錠 10mg 「TSU」) を対照として、下記に示す 4 種試験液を用いて溶出試験を実施した結果、アトルバスタチン錠 5mg 「TSU」の溶出パターンは、標準製剤と同等であった。 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <p>pH1.2, 50回転</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>pH3.0, 50回転</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>pH6.8, 50回転</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>水, 50回転</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>pH6.8, 100回転</p> </div> </div>	