




製品別比較表

2020年4月改訂

商品名	ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg「ツルハラ」	標準品																		
会社名	鶴原製薬株式会社																			
薬価	5.5円/錠	6.4円/錠																		
薬効分類名	鎮けい剤/124																			
組成	ブチルスコポラミン臭化物 10mg 含有																			
性状	白色糖衣錠 	白色の糖衣錠 																		
添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、カルメロース、メチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、白糖、沈降炭酸カルシウム、アラビアゴム末、ヒプロメロース、マクロゴール6000、硫酸カルシウム、ポリオキシエチレン(105)ポリオキシプロピレン(5)グリコール、タルク、カルナウバロウ	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム、酒石酸、白糖、タルク、アラビアゴム末、酸化チタン、マクロゴール6000、カルナウバロウ、サラシミツロウ、白色セラック、ラウリル硫酸ナトリウム																		
効能・効果	下記疾患における痙攣並びに運動機能亢進 胃・十二指腸潰瘍、食道痙攣、幽門痙攣、胃炎、腸炎、腸疝痛、痙攣性便秘、機能性下痢、胆のう・胆管炎、胆石症、胆道ジスキネジー、胆のう切除後の後遺症、尿路結石症、膀胱炎、月経困難症																			
用法・用量	ブチルスコポラミン臭化物として、通常成人1回10~20mgを1日3~5回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。																			
溶出挙動の同等性(局外規による溶出試験)	日本薬局方外医薬品規格第三部「ブチルスコポラミン臭化物錠」の判定基準に適合した。 (オレンジブックNo. 18掲載) 試験液:水、回転率:毎分50回転、第2法、規定時間:120分、溶出率:80%以上  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>溶出試験結果の推定値</caption> <thead> <tr> <th>時間(分)</th> <th>ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 (%)</th> <th>標準品 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>30</td><td>45</td><td>38</td></tr> <tr><td>60</td><td>90</td><td>82</td></tr> <tr><td>90</td><td>95</td><td>92</td></tr> <tr><td>120</td><td>95</td><td>95</td></tr> </tbody> </table> 両製剤の溶出挙動は同等であった。		時間(分)	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 (%)	標準品 (%)	0	0	0	30	45	38	60	90	82	90	95	92	120	95	95
時間(分)	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 (%)	標準品 (%)																		
0	0	0																		
30	45	38																		
60	90	82																		
90	95	92																		
120	95	95																		