



# 製品別比較表

2020年4月改訂

製品名	カンデサルタン錠 8mg 「ツルハラ」	標準品
販売会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	20.4 円/錠	108.4 円/錠
薬効分類名	血圧降下剤/214	
組成	1 錠中カンデサルタン シレキセチル 8mg	
性状	ごくうすい橙色の割線入り素錠 識別記号：表面 TSU157、裏面 8 直径約 7.0mm 厚さ約 2.5mm 質量約 125mg	ごくうすいだいだい色の割線入りの素錠 直径 7.1mm 厚さ 2.6mm
添加物	軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、乳糖水和物、 トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセル ロース、クロスカルメロースナトリウム、ス テアリン酸マグネシウム	トウモロコシデンプン、カルメロースカルシウ ム、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴ ール 6000、ステアリン酸マグネシウム、乳糖 水和物、黄色 5 号
効能・効果	高血圧症 腎実質性高血圧症 下記の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合 慢性心不全（軽症～中等症）	
用法・用量	高血圧症 成人 通常、成人には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 4～8mg を経口投与し、必要に 応じ 12mg まで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、1 日 1 回 2mg から投与を開始し、 必要に応じ 8mg まで増量する。 小児 通常、1 歳以上 6 歳未満の小児には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 0.05～ 0.3mg/kg を経口投与する。 通常、6 歳以上の小児には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 2～8mg を経口投与 し、必要に応じ 12mg まで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、低用量から投与を開始 し、必要に応じて 8mg まで増量する。 腎実質性高血圧症 通常、成人には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 2mg から経口投与を開始し、 必要に応じ 8mg まで増量する。 下記の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合 慢性心不全（軽症～中等症） 通常、成人には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 4mg から経口投与を開始し、必 要に応じ 8mg まで増量できる。 なお、原則として、アンジオテンシン変換酵素阻害剤以外による基礎治療は継続すること。	
薬物動態(生物学的同等性)		
溶出試験	試験液：0.1% tween80入り pH6.8（回転数：50回転）  試験液 pH1.2、4.0、6.8、水、界面活性剤添加の pH1.2、 4.0、6.8 で実施。	
血中濃度比較試験	 クロスオーバー法により各 1 錠を単回経口投与し、 生物学的に同等と判定された。	