




製品別比較表

2020年4月改訂

| | | |
|--|--|---|
| 製品名 | カンデサルタン錠 12mg 「ツルハラ」 | 標準品 |
| 販売会社名 | 鶴原製薬株式会社 | |
| 薬価 | 25.8 円/錠 | 163.9 円/錠 |
| 薬効分類名 | 血圧降下剤/214 | |
| 組成 | 1 錠中カンデサルタン シレキセチル 12mg | |
| 性状 | うすい橙色の割線入り素錠 識別記号：表面 TSU158、裏面 12 直径約 7.0mm 厚さ約 2.5mm 質量約 125mg  | うすいだいだい色の割線入りの素錠 直径 7.1mm 厚さ 2.6mm |
| 添加物 | 軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、乳糖水和物、 トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセル ロース、クロスカルメロースナトリウム、ス テアリン酸マグネシウム | トウモロコシデンプン、カルメロースカルシウ ム、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴ ール 6000、ステアリン酸マグネシウム、乳糖 水和物、黄色 5 号 |
| 効能・効果 | 高血圧症 腎実質性高血圧症 | |
| 用法・用量 | 高血圧症 成人 通常、成人には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 4~8mg を経口投与し、必要に 応じ 12mg まで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、1 日 1 回 2mg から投与を開始し、 必要に応じ 8mg まで増量する。 小児 通常、1 歳以上 6 歳未満の小児には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 0.05~ 0.3mg/kg を経口投与する。 通常、6 歳以上の小児には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 2~8mg を経口投与 し、必要に応じ 12mg まで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、低用量から投与を開始 し、必要に応じて 8mg まで増量する。 腎実質性高血圧症 通常、成人には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 2mg から経口投与を開始し、 必要に応じ 8mg まで増量する。 | |
| 薬物動態(生物学的同等性) | | |
| 溶出試験  試験液: 0.1% tween80入り pH6.8 (回転数: 50回転) 試験液 pH1.2、4.0、6.8、水、界面活性剤添加の pH1.2、 4.0、6.8 で実施。 | 血中濃度比較試験  クロスオーバー法により各 1 錠を単回経口投与し、 生物学的に同等と判定された。 | |