


製品別比較表

2021年4月改訂

製品名	メトクロプラミド細粒 2%「ツルハラ」	標準品
販売会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	6.3 円/1g	13.5 円/1g
薬効分類名	その他の消化器官用薬/239	
組成	1 g 中メトクロプラミド 15.35mg (塩酸メトクロプラミドに換算して 20mg) 含有	
性状	白色の散剤でにおいはなく、味は初めやや甘く後苦い。本品は1包の内容量 0.5g の分包装品もある。	白色細粒
添加物	乳糖水和物、白糖、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、含水二酸化ケイ素	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、デキストリン
効能・効果	次の場合における消化器機能異常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満感） 胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胆嚢・胆道疾患、腎炎、尿毒症、乳幼児嘔吐、薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結核剤・麻酔剤）投与時、胃内・気管内挿管時、放射線照射時、開腹術後。 X線検査時のバリウムの通過促進	
用法・用量	メトクロプラミドとして、通常成人1日 7.67～23.04mg（塩酸メトクロプラミドに換算して 10～30mg：細粒 0.5～1.5g）を2～3回に分割し、食前に経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。	

標準製剤との同等性

試験液:薄めた pH6.8 のリン酸塩緩衝液(1→2)、
回転率:毎分 50 回転、第 2 法、規定時間:15 分、
溶出率:75%以上 (オレンジブック No.10 掲載)



両製剤の溶出挙動は同等であった。

健康成人男子 12 名に各 1g ずつ (メトクロプラミドとして 15.35mg [塩酸メトクロプラミドとして 20mg]) をクロスオーバー法によって空腹時経口投与した。

両製剤の血中濃度の推移は同等であった。

