





製品別比較表

2020年4月改訂

商品名	クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg 「ツルハラ」	標準品
会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	5.7円/錠	8.4円/錠
薬効分類名	無機質製剤/322	
組成	1錠中クエン酸第一鉄ナトリウム 470.9mg (鉄として 50.0mg) 含有	
性状	直径約10.1mm、厚さ約5.8mm、重量約525mgの白色フィルムコーティング錠である。  直径：約 10.1mm 厚さ：約 5.8mm 質量 525mg	白色の胃溶性フィルムコート錠  直径：約 10.3mm 厚さ：約 5.0mm 重量：約 550mg
添加物	乳糖水和物、カルメロースカルシウム、ポビドン、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、タルク、酸化チタン、カルナウバロウ	カルメロース、結晶セルロース、酸化チタン、ステアリン酸カルシウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール 6000
効能・効果	鉄欠乏性貧血	
用法・用量	通常成人は鉄として1日100～200mg (2～4錠) を1～2回に分けて食後経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。	
溶出挙動の同等性(局外規による溶出試験) 生物学的同等性(血中濃度の推移)	試験液：水、回転率：50回転、第2法 規定時間：45分 溶出率：75%以上 (オレンジブック No. 22 掲載)  <p>両製剤の溶出挙動は同等であった。</p>	健康成人男子 12名に各2錠ずつ(鉄として100mg)をクロスオーバー法によって空腹時経口投与した。両製剤の血中濃度の推移は同等であった。  <p>(mean ± S. E.、n=12)</p>