





製品別比較表

2020年4月改訂

商品名	ドンペリドン錠 10mg 「ツルハラ」	標準品
会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	5.9円/錠	13.2円/錠
薬効分類名	その他の消化器官用剤/239	
組成	1錠中ドンペリドン 10mg 含有	
性状	白色の割線を有するフィルムコーティング錠で、識別記号はF27である。  直径:約6.6mm 厚さ:約2.9mm 質量:約103mg	白色 フィルムコーティング錠  直径:7.1mm 厚さ:3.4mm 質量:0.11g
添加物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ポリビニルアルコール (部分けん化物)、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ	日局カルナウバロウ、日局軽質無水ケイ酸、日局酸化チタン、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、日局バレイショデンプン、日局ヒプロメロース (置換度タイプ:2910)、ポリビニルアルコール (部分けん化物)、日局マクロゴール6000
効能・効果	下記疾患および薬剤投与時の消化器症状 (悪心、嘔吐、食欲不振、腹部膨満、上腹部不快感、腹痛、胸やけ、嘔気) 成人:○慢性胃炎、胃下垂症、胃切除後症候群 ○抗悪性腫瘍剤またはレボドパ製剤投与時 小児:○周期性嘔吐症、上気道感染症 ○抗悪性腫瘍剤投与時	
用法・用量	成人:通常、ドンペリドンとして1回10mgを1日3回食前に経口投与する。ただし、レボドパ製剤投与時にはドンペリドンとして1回5~10mgを1日3回食前に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 小児:通常、ドンペリドンとして1日1.0~2.0mg/kgを1日3回食前に分けて経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。 ただし、1日投与量はドンペリドンとして30mgを超えないこと。 また、6歳以上の場合はドンペリドンとして1日最高用量は1.0mg/kgを限度とすること。	
溶出挙動の同等性 (局外規による溶出試験) 生物学的同等性 (血中濃度の推移)	試験液:pH6.0 のリン酸一水素ナトリウム・クエン酸緩衝液、回転率:50回転、第2法、規定時間:45分、溶出率:75%以上(オレンジブック No.2 掲載)  両製剤の溶出挙動は同等であった。	健康成人男子12名に各3錠*ずつ(ドンペリドンとして30mg)をクロスオーバー法によって空腹時経口投与した。両製剤の血中濃度の推移は同等であった。  (mean±S.E., n=12) ※ 1回3錠は承認外の用量である。