


# 製品別比較表

2020年4月改訂


製品名	メトクロプラミド錠 5mg 「ツルハラ」	標準品
販売会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	5.7円/錠	6.5円/錠
薬効分類名	その他の消化器官用薬/239	
組成	1錠中メトクロプラミド 3.84mg (塩酸メトクロプラミドに換算して 5mg) 含有	
性状	白色～微黄白色のフィルムコーティング錠である。 直径：約 6.1mm 厚さ：約 3.0mm 質量：約 93mg	白色フィルムコート錠 直径：約 6.1mm 厚さ：約 2.9mm 質量：約 92mg
添加物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、ヒプロメロース、 <u>マクロゴール 6000</u> 、タルク、 <u>酸化チタン</u> 、 <u>カルナウバロウ</u>	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、沈降炭酸カルシウム
効能・効果	次の場合における消化器機能異常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満感） 胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胆嚢・胆道疾患、腎炎、尿毒症、乳幼児嘔吐、薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結核剤・麻酔剤）投与時、胃内・気管内挿管時、放射線照射時、開腹術後。 X線検査時のバリウムの通過促進	
用法・用量	メトクロプラミドとして、通常成人1日 7.67～23.04mg（塩酸メトクロプラミドに換算して 10～30mg：2～6錠）を2～3回に分割し、食前に経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。	

## 標準製剤との同等性

健康成人男子 12 名に各 3 錠ずつ（メトクロプラミドとして 11.52mg [塩酸メトクロプラミドとして 15mg]）をクロスオーバー法によって空腹時経口投与した。  
両製剤の血中濃度の推移は同等であった。



試験液:溶出試験液第2液、  
回転率:毎分50回転、第2法  
規定時間:45分 溶出率:80%以上  
(オレンジブック No.10 掲載)



両製剤の溶出挙動は同等であった。