



製品別比較表

2025年4月改訂

| 商品名 | ケトチフェン DS 小児用 0.1% 「ツルハラ」 | ザジテンドライシロップ 0.1% | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---------|--------------|------------------------|-------------|------------------------|-------|------------------------|
| 会社名 | 鶴原製薬株式会社 | | | | | | | | | |
| 薬価 | 6.70 円/1g | 9.80 円/1g | | | | | | | | |
| 薬効分類名 | アレルギー性疾患治療剤/449 | | | | | | | | | |
| 組成 | 1g 中ケトチフェンフマル酸塩 1.38mg (ケトチフェンとして 1mg) 含有 | | | | | | | | | |
| 性状 | 白色のシロップ剤で芳香を有する。 | 白色の粉末を含む微細な粒子で、芳香があり味は甘い。 | | | | | | | | |
| 添加物 | パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、香料、白糖、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、ヒドロキシプロピルセルロース、モノステアリン酸グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル | 白糖、ヒプロメロース、アラビアゴム、シリコーン樹脂、無水ケイ酸、酸化チタン、香料、グリセリン、プロピレングリコール、エチルバニリン、バニリン、D-マンニトール | | | | | | | | |
| 効能・効果 | <ul style="list-style-type: none"> ○気管支喘息 ○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹、湿疹、皮膚炎、皮膚そう痒症 | | | | | | | | | |
| 用法・用量 | <p>通常、小児には1日量 0.06g/kg (ケトチフェンとして 0.06mg/kg) を2回、朝食後及び就寝前に分け、用時溶解して経口投与する。なお、年齢・症状により適宜増減する。 年齢別の標準投与量は、通常、下記の用量を1日量とし、1日2回、朝食後及び就寝前に分け、経口投与する。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>年 齢</th> <th>1 日 用 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 か月以上 3 歳未満</td> <td>0.8g (ケトチフェンとして 0.8mg)</td> </tr> <tr> <td>3 歳以上 7 歳未満</td> <td>1.2g (ケトチフェンとして 1.2mg)</td> </tr> <tr> <td>7 歳以上</td> <td>2.0g (ケトチフェンとして 2.0mg)</td> </tr> </tbody> </table> <p>ただし、1歳未満の乳児に使用する場合には体重、症状などを考慮して適宜投与量を決めること。</p> | | 年 齢 | 1 日 用 量 | 6 か月以上 3 歳未満 | 0.8g (ケトチフェンとして 0.8mg) | 3 歳以上 7 歳未満 | 1.2g (ケトチフェンとして 1.2mg) | 7 歳以上 | 2.0g (ケトチフェンとして 2.0mg) |
| 年 齢 | 1 日 用 量 | | | | | | | | | |
| 6 か月以上 3 歳未満 | 0.8g (ケトチフェンとして 0.8mg) | | | | | | | | | |
| 3 歳以上 7 歳未満 | 1.2g (ケトチフェンとして 1.2mg) | | | | | | | | | |
| 7 歳以上 | 2.0g (ケトチフェンとして 2.0mg) | | | | | | | | | |
| 溶出挙動の同等性 (局外規による溶出試験) 生物学的同等性 (血中濃度の推移) | <p>試験液:水、回転率:毎分50回転、第2法、規定時間:15分 溶出率:85%以上 (オレンジブック No. 21 掲載)</p>  <p>両剤の溶出挙動は同等であった。</p> | <p>健康成人男子12名に各2gずつ(ケトチフェンとして2mg)をクロスオーバー法によって空腹時経口投与した。両剤の血中濃度の推移は同等であった。</p>  <p>(mean ± S. E.、n=12)</p> | | | | | | | | |