





# 製品別比較表

2020年4月改訂

商品名	メキタジン錠 3mg「ツルハラ」	標準品
会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	5.70円/錠	8.40円/錠
薬効分類名	抗ヒスタミン剤/441	
組成	1錠中メキタジン 3mg を含有	
性状	白色で割線を有する素錠で、 識別記号は TSU752 である。	白色の割線入り錠剤
	 <p>直径：約6.0mm 厚さ：約2.5mm 質量：約90mg</p>	 <p>直径：約8.0mm 厚さ：約2.5mm 質量：約170mg</p>
添加物	D-マンニトール、トウモロコシデンプン、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム	D-マンニトール、トウモロコシデンプン、カルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム
効能・効果	気管支喘息、アレルギー性鼻炎、じん麻疹、皮膚疾患に伴う痒痒（湿疹・皮膚炎、皮膚痒痒症）	
用法・用量	<p>気管支喘息の場合 通常成人1回2錠（メキタジンとして6mg）を1日2回経口投与する。 なお、年齢、症状に応じ適宜増減する。</p> <p>アレルギー性鼻炎、じん麻疹、皮膚疾患に伴う痒痒（湿疹・皮膚炎、皮膚痒痒症）の場合 通常成人1回1錠（メキタジンとして3mg）を1日2回経口投与する。 なお、年齢、症状に応じ適宜増減する。</p>	
溶出挙動の同等性(局外規による溶出試験) 生物学的同等性(血中濃度の推移)	<p>日本薬局方医薬品各条に定められたメキタジン錠の溶出規格に適合していることが確認されている。 (オレンジブックNo. 26掲載) 第2法、試験液:pH6.8の溶出試験第2液、 回転率：毎分50回転、 規定時間：45分、溶出率：70%以上</p>  <p>両製剤の溶出挙動は同等であった。</p>	<p>健康成人男子 12 名に各 5 錠*ずつを空腹時経口投与した。(※5 錠は承認外の用量) 両製剤の血中濃度の推移は同等であった。</p>  <p>mean ± S. E.、n=12</p>