



製品別比較表

2020年4月改訂

商品名	ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「ツルハラ」	標準品
会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	6.4円/錠	7.2円/錠
薬効分類名	血管拡張剤/217	
組成	1錠中ベラパミル塩酸塩 40mg 含有	
性状	黄色の糖衣錠である。 	黄緑色の糖衣錠である。 
添加物	黄色4号 (タートラジン)、乳糖水和物、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、白色セラック、ヒマシ油、ゼラチン、アラビアゴム末、沈降炭酸カルシウム、タルク、白糖、ミツロウ	アラビアゴム末、黄色4号 (タートラジン) アルミニウムレーキ、カルナウバロウ、含水二酸化ケイ素、結晶セルロース、酸化チタン、ステアリン酸、ステアリン酸カルシウム、青色1号アルミニウムレーキ、精製白糖、タルク、沈降炭酸カルシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、白色セラック、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、マクロゴール 6000
効能・効果	成人 頻脈性不整脈 (心房細動・粗動、発作性上室性頻拍) 狭心症、心筋梗塞 (急性期を除く)、その他の虚血性心疾患 小児 頻脈性不整脈 (心房細動・粗動、発作性上室性頻拍)	
用法・用量	成人 頻脈性不整脈 (心房細動・粗動、発作性上室性頻拍) ベラパミル塩酸塩として、通常成人1回 40~80mg を1日3回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜減量する。 狭心症、心筋梗塞 (急性期を除く)、その他の虚血性心疾患 ベラパミル塩酸塩として、通常成人1回 40~80mg を1日3回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 小児 頻脈性不整脈 (心房細動・粗動、発作性上室性頻拍) 通常、小児には、ベラパミル塩酸塩として1日 3~6mg/kg (ただし、1日 240mg を超えない) を、1日3回に分けて経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜減量する。	
生物学的同等性 (血中濃度の推移)	家兎10羽に各2錠 (ベラパミル塩酸塩として80mg) をクロスオーバー法によって強制経口投与した。両製剤の血中濃度の推移は同等であった。 