


製品別比較表

2020年4月改訂

製品名	リボフラビン酪酸エステル錠 20mg 「ツルハラ」	標準品
販売会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	5.5 円/錠	5.7 円/錠
薬効分類名	ビタミンB剤/313	
組成	1錠中リボフラビン酪酸エステル 20mg 含有	
性状	橙黄色の割線入り錠剤である。識別記号は TSU861 である。  直径：約 8.0mm 厚さ：約 3.5mm 重量：約 190mg	黄色～淡褐黄色・素錠 長径：10.5mm 短径：5.5mm 厚さ：3.6mm 重量：約 188mg
添加物	乳糖水和物、 <u>パレイショデンプン</u> 、 <u>結晶セルロース</u> 、 <u>カルメロースカルシウム</u> 、 <u>ヒドロキシプロピルセルロース</u> 、 <u>ステアリン酸マグネシウム</u>	ステアリン酸マグネシウム、マクロゴール 6000、カルメロースカルシウム、ポビドン、乳糖水和物
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> ・高コレステロール血症 ・ビタミン B2 欠乏症の予防及び治療 ・下記疾患のうち、ビタミン B2 の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合 口角炎、口唇炎、舌炎、脂漏性湿疹、結膜炎、びまん性表層角膜炎 ・ビタミン B2 の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、はげしい肉体労働時等） 高コレステロール血症及びビタミン B2 の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合の適応に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用しないこと。	
用法・用量	リボフラビン酪酸エステルとして、通常、成人 1 日 5～20mg を 2～3 回に分割経口投与する。 高コレステロール血症には、通常、成人 1 日 60～120mg を 2～3 回に分割経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。	

標準製剤との同等性

標準製剤を対照としたリボフラビン酪酸エステル錠 20mg「ツルハラ」の溶出試験結果を下図にそれぞれ示す。リボフラビン酪酸エステル錠 20mg「ツルハラ」の溶出パターンは、標準製剤と同等であった。

