

# 製品別比較表

2020年4月改訂

製品名	リボフラビン酪酸エステル細粒 10%「ツルハラ」	標準品
販売会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	6.3円/1g	12.5円/1g
薬効分類名	ビタミンB剤/313	
組成	1g中リボフラビン酪酸エステル100mg含有	
性状	橙黄色の細粒である。	黄色～淡褐色・細粒・わずかに特異な臭気
添加物	乳糖水和物、 <u>トウモロコシデンプン造粒物</u> 、 <u>ヒドロキシプロピルセルロース</u> 、 <u>タルク</u> 、 <u>ポリソルベート80</u>	ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸ポリオキシル、乳糖水和物
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高コレステロール血症</li> <li>・ビタミンB<sub>2</sub>欠乏症の予防及び治療</li> <li>・下記疾患のうち、ビタミンB<sub>2</sub>の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合 口角炎、口唇炎、舌炎、脂漏性湿疹、結膜炎、びまん性表層角膜炎</li> <li>・ビタミンB<sub>2</sub>の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、はげしい肉体労働時等）</li> </ul> <p>高コレステロール血症及びビタミンB<sub>2</sub>の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合の適応に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用しないこと。</p>	
用法・用量	リボフラビン酪酸エステルとして通常、成人1日5～20mgを2～3回に分割経口投与する。高コレステロール血症には、通常、成人1日60～120mgを2～3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。	

## 標準製剤との同等性

標準製剤を対照としたリボフラビン酪酸エステル細粒10%「ツルハラ」の溶出試験結果を下図にそれぞれ示す。

リボフラビン酪酸エステル細粒10%「ツルハラ」の溶出パターンは、標準製剤と同等であった。

