

## 製品別比較表

2024年4月改訂

商品名	ビタミンK <sub>1</sub> 錠 5mg 「ツルハラ」	ケーワン錠 5mg
会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	5.70 円／錠	9.40 円／錠
薬効分類名	フィトナジオン製剤／316	
組成	1錠中フィトナジオン（ビタミンK <sub>1</sub> ）5mg含有	
性状	<p>橙黄色の糖衣錠                  直径：約 9.2mm                  厚さ：約 5.3mm                  質量：約350mg</p>	<p>淡黄色の素錠                  直径：10.1mm                  厚さ：3.5mm                  質量：360mg</p>
添加物	<p><u>黄色4号（タートラジン）</u>、<u>黄色5号</u>、乳糖水和物、<u>トウモロコシデンプン</u>、<u>結晶セルロース</u>、<u>ステアリン酸マグネシウム</u>、<u>ヒドロキシプロピルセルロース</u>、<u>白糖</u>、<u>アラビアゴム末</u>、<u>タルク</u>、<u>沈降炭酸カルシウム</u>、<u>ゼラチン</u>、<u>精製セラック</u>、<u>ミツロウ</u></p>	<p>含水二酸化ケイ素、結晶セルロース、タルク、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、パラオキシ安息香酸ブチル、ポビドン</p>
効能・効果	<p>○ビタミンK欠乏症の予防及び治療                  各種薬剤（クマリン系抗凝血薬、サリチル酸、抗生物質など）投与中に起こる低プロトロンビン血症、胆道及び胃腸障害に伴うビタミンKの吸収障害、新生児の低プロトロンビン血症、肝障害に伴う低プロトロンビン血症</p> <p>○ビタミンK欠乏が推定される出血</p>	
用法・用量	<p>フィトナジオンとして、通常成人1日5～15mg、新生児出血の予防には母体に対し10mg、薬剤投与中におこる低プロトロンビン血症等には20～50mgを分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。</p>	