

## 医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会の IF 記載要領 2013 に準拠して作成

### ビタミンE剤

トコフェロール酢酸エステル錠 100mg 「ツルハラ」

トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% 「ツルハラ」

Tocopherol Acetate Tablets/Granules 「TSURUHARA」

剤形	錠 100mg:錠剤 顆粒 20%:顆粒剤
製剤の規制区分	該当しない
規格・含量	錠 100mg:1錠中トコフェロール酢酸エステル 100mg 含有 顆粒 20%:1g中トコフェロール酢酸エステル 200mg 含有
一般名	和名：トコフェロール酢酸エステル 洋名：Tocopherol Acetate
製造販売承認年月日 薬価基準収載・発売年月日	製造販売承認年月日:2019年7月1日（販売名変更による） 薬価基準収載年月日:2019年12月13日（販売名変更による） 発売年月日:1972年2月1日
開発・製造販売（輸入）・ 提携・販売会社名	製造販売元:鶴原製薬株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	鶴原製薬株式会社 医薬情報部 TEL:072-761-1456(代表) FAX:072-760-5252 医療関係者向けホームページ <a href="http://www.tsuruhara-seiyaku.co.jp/member/">http://www.tsuruhara-seiyaku.co.jp/member/</a>

本 IF は 2019 年 10 月改訂（第 7 版）の添付文書の記載に基づき作成した

最新の添付文書情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ

<http://www.info.pmda.go.jp/>にてご確認ください。

## IF 利用の手引きの概要 —日本病院薬剤師会—

### 1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書(以下、添付文書と略す)がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和 63 年に日本病院薬剤師会(以下、日病薬と略す)学術第2小委員会が「医薬品インタビューフォーム」(以下、IFと略す)の位置付け並びにIF記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10 年 9 月に日病薬学術第3小委員会においてIF記載要領の改訂が行われた。

更に 10 年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境が大きく変化したことを受けて、平成 20 年 9 月に日病薬医薬情報委員会においてIF記載要領 2008 が策定された。

IF記載要領 2008 では、IFを紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF等の電磁的データとして提供すること(e-IF)が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版のe-IFが提供されることとなった。

最新版のe-IFは、(独) 医薬品医療機器総合機構の医薬品情報提供ホームページ(<http://www.info.pmda.go.jp/>)から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-IFを掲載する医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせてe-IFの情報を検討する組織を設置して、個々のIFが添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008 年より年4回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、IF 記載要領の一部改訂を行いIF 記載要領 2013 として公表する運びとなった。

### 2. IFとは

IFは「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたIFは、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

[IFの様式]

① 規格はA4版、横書きとし、原則として9ポイント以上の字体(図表は除く)で記載し、一色刷りとする。

ただし、添付文書で赤字・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。

②IF記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。

③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2頁にまとめる。

[IFの作成]

①IFは原則として製剤の投与経路別(内用剤、注射剤、外用剤)に作成される。

②IFに記載する項目及び配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠する。

③添付文書の内容を補完するとのIFの主旨に沿って必要な情報が記載される。

④製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。

⑤「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」(以下、「IF記載要領 2013」と略す)により作成されたIFは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体(PDF)から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

[IFの発行]

①「IF記載要領 2013」は、平成25年10月以降に承認された新医薬品から適用となる。

②上記以外の医薬品については、「IF記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものではない。

③使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果(臨床再評価)が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはIFが改訂される。

### 3. IFの利用にあたって

「IF記載要領 2013」においては、PDFファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体のIFについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることもあり、その取扱いには十分留意すべきである。

### 4. 利用に際しての留意点

IFを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。IFは日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、IFがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013年4月改訂)

# 目次

<b>I. 概要に関する項目</b> .....	1	2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む).....	11
1. 開発の経緯.....	1	3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由.....	11
2. 製品の治療学的・製剤学的特性.....	1	4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由.....	11
<b>II. 名称に関する項目</b> .....	2	5. 慎重投与内容とその理由.....	11
1. 販売名.....	2	6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法.....	11
2. 一般名.....	2	7. 相互作用.....	11
3. 構造式又は示性式.....	2	8. 副作用.....	11
4. 分子式及び分子量.....	2	9. 高齢者への投与.....	12
5. 化学名(命名法).....	2	10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与.....	12
6. 慣用名、別名、略号、記号番号.....	2	11. 小児等への投与.....	12
7. CAS登録番号.....	2	12. 臨床検査結果に及ぼす影響.....	12
<b>III. 有効成分に関する項目</b> .....	3	13. 過量投与.....	12
1. 物理化学的性質.....	3	14. 適用上の注意.....	12
2. 有効成分の各種条件下における安定性.....	3	15. その他の注意.....	12
3. 有効成分の確認試験法.....	3	16. その他.....	12
4. 有効成分の定量法.....	3	<b>IX. 非臨床試験に関する項目</b> .....	13
<b>IV. 製剤に関する項目</b> .....	4	1. 薬理試験.....	13
1. 剤形.....	4	2. 毒性試験.....	13
2. 製剤の組成.....	4	<b>X. 管理的事項に関する項目</b> .....	14
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意.....	4	1. 規制区分.....	14
4. 製剤の各種条件下における安定性.....	4	2. 有効期間又は使用期限.....	14
5. 調製法及び溶解後の安定性.....	6	3. 貯法・保存条件.....	14
6. 他剤との配合変化(物理化学的変化).....	6	4. 薬剤取扱い上の注意点.....	14
7. 溶出性.....	6	5. 承認条件等.....	14
8. 生物学的試験法.....	6	6. 包装.....	14
9. 製剤中の有効成分の確認試験法.....	6	7. 容器の材質.....	14
10. 製剤中の有効成分の定量法.....	6	8. 同一成分・同効薬.....	14
11. 力価.....	6	9. 国際誕生年月日.....	15
12. 混入する可能性のある夾雑物.....	6	10. 製造販売承認年月日及び承認番号.....	15
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報.....	6	11. 薬価基準収載年月日.....	15
14. その他.....	6	12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容.....	15
<b>V. 治療に関する項目</b> .....	7	13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容.....	15
1. 効能又は効果.....	7	14. 再審査期間.....	15
2. 用法及び用量.....	7	15. 投薬期間制限医薬品に関する情報.....	15
3. 臨床成績.....	7	16. 各種コード.....	15
<b>VI. 薬効薬理に関する項目</b> .....	8	17. 診療報酬上の注意.....	15
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群.....	8	<b>X I. 文献</b> .....	16
2. 薬理作用.....	8	1. 引用文献.....	16
<b>VII. 薬物動態に関する項目</b> .....	9	2. その他の参考文献.....	16
1. 血中濃度の推移・測定法.....	9	<b>X II. 参考資料</b> .....	16
2. 薬物速度論的パラメータ.....	9	1. 主な外国での発売状況.....	16
3. 吸収.....	9	2. 海外における臨床支援情報.....	16
4. 分布.....	10	<b>X III. 備考</b> .....	16
5. 代謝.....	10	その他の関連資料.....	16
6. 排泄.....	10		
7. トランスポーターに関する情報.....	10		
8. 透析等による除去率.....	10		
<b>VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目</b> .....	11		
1. 警告内容とその理由.....	11		

## I. 概要に関する項目

### 1. 開発の経緯

後発医薬品として「ユベ-E・100/ユベ-E顆粒」の開発を企画し、規格及び試験方法を設定、1970年に承認を取得し上市した。その後、「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いについて」(平成12年9月19日医薬発第935号)に基づき、販売名を「ユベ-E錠100mg/ユベ-E顆粒20%」と変更し、2009年に承認を取得し、2009年9月に薬価収載された。

「医療用後発品の販売名の一般的名称への変更に係る代替新規承認申請の取得について」(平成29年6月30日付医政経発0630第1号・薬生薬審発0630第5号・薬生安発0630第1号)に基づき、医療事故防止対策として販売名を「トコフェロール酢酸エステル錠100mg「ツルハラ」/トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」」と変更し、2019年7月に承認を取得し、2019年12月に薬価収載された。

### 2. 製品の治療学的・製剤学的特性

- (1) 本剤はトコフェロール酢酸エステルを有効成分とするビタミンE剤である。
- (2) 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。  
副作用として、便秘、胃部不快感、下痢、発疹があらわれることがある。

## Ⅱ. 名称に関する項目

### 1. 販売名

(1)和名：

トコフェロール酢酸エステル錠 100mg 「ツルハラ」

トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% 「ツルハラ」

(2)洋名：

Tocopherol Acetate Tablets 100mg 「TSURUHARA」

Tocopherol Acetate Granules 20% 「TSURUHARA」

(3)名称の由来

一般名+剤形+規格(含量)+ 「ツルハラ」

〔「医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について」

(平成 17 年 9 月 22 日 薬食審査発第 0922001 号)に基づく〕


### 2. 一般名

(1)和名(命名法)：トコフェロール酢酸エステル

(2)洋名(命名法)：Tocopherol Acetate

(3)ステム：不明

### 3. 構造式又は示性式



### 4. 分子式及び分子量

分子式：C<sub>31</sub>H<sub>52</sub>O<sub>3</sub>

分子量：472.74

### 5. 化学名(命名法)

2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl acetate

### 6. 慣用名、別名、略号、記号番号

別名：酢酸トコフェロール

### 7. CAS登録番号

7695-91-2

### Ⅲ. 有効成分に関する項目

#### 1. 物理化学的性質

- (1)外観・性状 : トコフェロール酢酸エステルは無色～黄色澄明の粘性の液で、においはない。
- (2)溶解性 : 本品はエタノール(99.5)、アセトン、クロロホルム、ジエチルエーテル、ヘキサン又は植物油と混和する。本品はエタノール(95)に溶けやすく、水にほとんど溶けない。
- (3)吸湿性 : 該当資料なし
- (4)融点(分解点)、沸点、凝固点 : 該当資料なし
- (5)酸塩基解離定数 : 該当資料なし
- (6)分配係数 : 該当資料なし
- (7)その他の主な示性値 : 本品は旋光性を示さない。

#### 2. 有効成分の各種条件下における安定性

本品は空気及び光によって変化する。

#### 3. 有効成分の確認試験法

- (1)硝酸による呈色反応
- (2)赤外吸収スペクトル測定法

#### 4. 有効成分の定量法

液体クロマトグラフィー

## IV. 製剤に関する項目

### 1. 剤形

(1) 剤形の区別、外観及び性状：

トコフェロール酢酸エステル錠 100mg 「ツルハラ」：直径約 10.5mm、厚さ約 6.5mm、  
質量約 500mg の橙色糖衣錠

トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% 「ツルハラ」：白色の顆粒剤

(2) 製剤の物性：該当資料なし

(3) 識別コード：なし

(4) pH、浸透圧比、粘度、比重、無菌の旨及び安定な pH 域等：該当資料なし

### 2. 製剤の組成

(1) 有効成分(活性成分)の含量：

トコフェロール酢酸エステル錠 100mg 「ツルハラ」：

1 錠中トコフェロール酢酸エステル 100mg 含有

トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% 「ツルハラ」：

1 g 中トコフェロール酢酸エステル 200mg 含有

(2) 添加物：

トコフェロール酢酸エステル錠 100mg 「ツルハラ」：

黄色 5 号、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、カルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、精製白糖、沈降炭酸カルシウム、タルク、アラビアゴム末、カルナウバロウ

トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% 「ツルハラ」：

軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、カルメロースナトリウム、乳糖水和物

(3) その他：該当資料なし

### 3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意

該当資料なし

### 4. 製剤の各種条件下における安定性

【トコフェロール酢酸エステル錠 100mg 「ツルハラ」】

試験期間及び保管	試験期間	保存包装	試験項目
長期保存試験 室温	5 年	① PTP 包装 ② バラ包装	(1) 性状 (2) 確認試験 (3) 崩壊試験 (4) 定量

(1) 性状

いずれの条件においても、変化は認められなかった。

(2) 確認試験



いずれの条件においても、すべて「適」であった。

(3) 重量偏差試験

いずれの条件においても、すべて「適」であった。

(4) 崩壊試験

いずれの条件においても、変化は認められなかった。

(5) 定量

いずれの条件においても、含量の低下はほとんど認められなかった。

以上の結果から、本剤はこの包装形態において、室温で5年間安定であった。

よって本剤の有効期限は5年間とする。

【トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% 「ツルハラ」】

試験期間及び保管	試験期間	保存包装	試験項目
長期保存試験 室温	5年	バラ包装	(1) 性状 (2) 確認試験 (3) 崩壊試験 (4) 定量

(1) 性状

いずれの条件においても、変化は認められなかった。

(2) 確認試験

いずれの条件においても、すべて「適」であった。

(3) 崩壊試験

いずれの条件においても、すべて「適」であった。

(4) 定量

いずれの条件においても、含量の低下はほとんど認められなかった。

以上の結果から、本剤はこの包装形態において、室温で5年間安定であった。

よって本剤の有効期限は5年間とする。

無包装状態での安定性試験 3カ月

【トコフェロール酢酸エステル錠 100mg 「ツルハラ」】

	40±2℃	25±1℃ 75%RH±5%	60万 Lux・hr
外観 (性状)	変化なし	変化なし	変化なし
硬度	変化なし	変化なし	変化なし
崩壊	変化なし	変化なし	変化なし
含量	変化なし	変化あり (規格内)	変化なし

【トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% 「ツルハラ」】

	40±2℃	60万 Lux・hr
外観 (性状)	変化なし	変化なし
崩壊	変化なし	変化なし
含量	変化なし	変化なし

**5. 調製法及び溶解後の安定性**

該当資料なし

**6. 他剤との配合変化(物理化学的变化)**

該当資料なし

**7. 溶出性**

該当資料なし

**8. 生物学的試験法**

該当資料なし

**9. 製剤中の有効成分の確認試験法**

薄層クロマトグラフィー

**10. 製剤中の有効成分の定量法**

紫外可視吸光度測定法

**11. 力価**

該当しない

**12. 混入する可能性のある夾雑物**

該当資料なし

**13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報**

該当資料なし

**14. その他**

該当しない

## V. 治療に関する項目

### 1. 効能又は効果

1. ビタミンE欠乏症の予防及び治療
  2. 末梢循環障害(間歇性跛行症、動脈硬化症、静脈血栓症、血栓性静脈炎、糖尿病性網膜症、凍瘡、四肢冷感症)
  3. 過酸化脂質の増加防止
1. 以外の効能については、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきではない。

### 2. 用法及び用量

通常、成人にはトコフェロール酢酸エステルとして1回 50～100mg を、1日2～3回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

### 3. 臨床成績

#### (1)臨床データパッケージ

該当資料なし

#### (2)臨床効果

該当資料なし

#### (3)臨床薬理試験

該当資料なし

#### (4)探索的試験

該当資料なし

#### (5)検証的試験

##### 1)無作為化並行用量反応試験

該当資料なし

##### 2)比較試験

該当資料なし

##### 3)安全性試験

該当資料なし

##### 4)患者・病態別試験

該当資料なし

#### (6)治療的使用

##### 1)使用成績調査・特定使用成績調査(特別調査)・製造販売後臨床試験(市販後臨床試験)

該当資料なし

##### 2)承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要

該当しない

## VI. 薬効薬理に関する項目

### 1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群

該当資料なし

### 2. 薬理作用

#### (1)作用部位・作用機序

1. ビタミンEの代謝における特異的意義は明らかにされていないが、Cytochrome b および c の間に働いている電子伝達系の cofactor として作用している。
2. 抗酸化作用  
フリーラジカルを消去することによって生体膜中に存在する多不飽和脂肪酸の過酸化反応を防止し、膜の構造や透過性維持に関与する。さらに、-SH 化合物やビタミン A 等の酸化も防止する<sup>1)</sup>。
3. 微小循環改善作用  
毛細血管抵抗性を上昇させるとともに皮膚血流量を増加させて皮膚温の上昇や寒冷負荷後の皮膚温回復を促進する<sup>2)</sup>。また、抗凝固作用、線溶促進作用により循環動態を改善する<sup>3)</sup>。
4. ラットで長期にわたる VE 欠乏により卵巣機能が低下し、VE 投与により回復が認められている<sup>4)</sup>。

#### (2)薬効を裏付ける試験成績

該当資料なし

#### (3)作用発現時間・持続時間

該当資料なし

## VII. 薬物動態に関する項目

### 1. 血中濃度の推移・測定法

#### (1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

#### (2) 最高血中濃度到達時間

(「臨床試験で確認された血中濃度」の項参照)

#### (3) 臨床試験で確認された血中濃度

該当資料なし

#### (4) 中毒域

該当資料なし

#### (5) 食事・併用薬の影響

(「VIII. 安全性 (使用上の注意等) に関する項目 7. 相互作用」の項を参照のこと)

#### (6) 母集団(ポピュレーション)解析により判明した薬物体内動態変動要因

該当資料なし

### 2. 薬物速度論的パラメータ

#### (1) 解析方法

該当資料なし

#### (2) 吸収速度定数

該当資料なし

#### (3) バイオアベイラビリティ

該当資料なし

#### (4) 消失速度定数

該当資料なし

#### (5) クリアランス

該当資料なし

#### (6) 分布容積

該当資料なし

#### (7) 血漿蛋白結合率

該当資料なし

### 3. 吸収

該当資料なし

#### 4. 分布

(1)血液-脳関門通過性

該当資料なし

(2)血液-胎盤関門通過性

該当資料なし

(3)乳汁への移行性

該当資料なし

(4)髄液への移行性

該当資料なし

(5)その他の組織への移行性

該当資料なし

#### 5. 代謝

(1)代謝部位及び代謝経路

該当資料なし

(2)代謝に関与する酵素(CYP450 等)の分子種

該当資料なし

(3)初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4)代謝物の活性の有無及び比率

該当資料なし

(5)活性代謝物の速度論的パラメータ

該当資料なし

#### 6. 排泄

(1)排泄部位及び経路

該当資料なし

(2)排泄率

該当資料なし

(3)排泄速度

該当資料なし

#### 7. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

#### 8. 透析等による除去率

該当資料なし

## VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

### 1. 警告内容とその理由

該当しない

### 2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)

該当しない

### 3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由

該当しない

### 4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由

該当しない

### 5. 慎重投与内容とその理由

該当しない

### 6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法

該当しない

### 7. 相互作用

#### (1)併用禁忌とその理由

併用禁忌 (併用しないこと)

該当しない

#### (2)併用注意とその理由

併用注意 (併用に注意すること)

該当しない

### 8. 副作用

#### (1)副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

#### (2)重大な副作用と初期症状

重大な副作用 (頻度不明)

該当資料なし

### (3)その他の副作用

	頻 度 不 明
消化器	便秘、胃部不快感、下痢
過敏症	発疹

### (4)項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

該当資料なし

### (5)基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度

該当資料なし

### (6)薬物アレルギーに対する注意及び試験法

該当資料なし

## 9. 高齢者への投与

該当資料なし

## 10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

該当資料なし

## 11. 小児等への投与

該当資料なし

## 12. 臨床検査結果に及ぼす影響

該当資料なし

## 13. 過量投与

該当資料なし

## 14. 適用上の注意

薬剤交付時：PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。  
(PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)

## 15. その他の注意

該当資料なし

## 16. その他

該当資料なし



## IX. 非臨床試験に関する項目

### 1. 薬理試験

(1)薬効薬理試験(「VI.薬効薬理に関する項目」参照)

該当資料なし

(2)副次的薬理試験

該当資料なし

(3)安全性薬理試験

該当資料なし

(4)その他の薬理試験

該当資料なし

### 2. 毒性試験

(1)単回投与毒性試験

該当資料なし

(2)反復投与毒性試験

該当資料なし

(3)生殖発生毒性試験

該当資料なし

(4)その他の特殊毒性

該当資料なし

## X. 管理的事項に関する項目

### 1. 規制区分

製剤：該当しない

有効成分：該当しない

### 2. 有効期間又は使用期限

使用期限：5年（安定性試験に基づく）

### 3. 貯法・保存条件

湿気を避けて遮光保存

### 4. 薬剤取扱い上の注意点

(1) 薬局での取り扱い上の留意点について

トコフェロール酢酸エステル錠 100mg 「ツルハラ」

湿気を避けて遮光保存（錠剤の表面が退色するおそれがあるので遮光して保存して下さい。

なお、表面が退色しても主成分の変化はありません。）

（「規制区分」及び「貯法・保存条件」の項を参照のこと）

(2) 薬剤交付時の取扱いについて（患者等に留意すべき必須事項等）

（「Ⅷ. 安全性（使用上の注意等）」に関する項目 14.適用上の注意」の項を参照のこと）

(3) 調剤時の留意点について

### 5. 承認条件等

なし

### 6. 包装

錠 100mg 100錠(PTP)、1000錠(PTP)、5000錠(PTP・バラ)

顆粒 20% 100g、1000g

### 7. 容器の材質

トコフェロール酢酸エステル錠 100mg 「ツルハラ」：

PTP包装：ポリ塩化ビニル アルミ箔

バラ包装：ポリエチレン袋 ブリキ缶

トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% 「ツルハラ」：

ポリエチレン袋 ブリキ缶

### 8. 同一成分・同効薬

同一成分：ユベラ錠 50mg 同効薬：トコフェロールニコチン酸エステル

9. 国際誕生年月日

不明

10. 製造販売承認年月日及び承認番号

製品名	製造販売承認年月日	承認番号
トコフェロール酢酸エステル錠 100m g 「ツルハラ」	2019年7月1日	30100AMX00069000
トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% 「ツルハラ」	2019年7月1日	30100AMX00068000

11. 薬価基準収載年月日

製品名	薬価基準収載年月日
トコフェロール酢酸エステル錠 100m g 「ツルハラ」	2019年12月13日
トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% 「ツルハラ」	2019年12月13日

12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

該当しない

13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

14. 再審査期間

該当しない

15. 投薬期間制限医薬品に関する情報

本剤は、投与期間に関する制限は定められていない。

16. 各種コード

製品名	HOT（9桁）番号	厚生労働省薬価基準収載医薬品コード	レセプト電算コード
トコフェロール酢酸エステル錠 100m g 「ツルハラ」	107141201	3150002F2065	620714102
トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% 「ツルハラ」	107133701	3150002D1068	620713302

17. 診療報酬上の注意

本剤は保険診療上の後発医薬品である。

## X I. 文献

### 1. 引用文献

- 1) Tappel, A. L. : Vitamins and Hormones, 20, 493 (1962)
- 2) 神村瑞夫 : ビタミン、33, 166 (1966)
- 3) 友田 豊 : ビタミン、27, 442 (1963)
- 4) 佐々木光司 : 日本不妊学会雑誌、5, 228 (1960)

### 2. その他の参考文献

第17改正 日本薬局方

## X II. 参考資料

### 1. 主な外国での発売状況

該当しない

### 2. 海外における臨床支援情報

該当しない

## X III. 備考

### その他の関連資料

なし



製造販売元

**鶴原製薬株式会社**

大阪府池田市豊島北1丁目16番1号

文献請求先：鶴原製薬（株）医薬情報部