

# 医薬品名：パルトックス細粒 20%(パンテチン)

試験ロット：801  
試験日：2008/05/03  
試験者：上林昭久

## 1. 簡易懸濁法試験結果

### 1) 試験方法

シリンジのピストン部を抜き取り、シリンジ内に顆粒をそのまま 1g (一回投与量) 入れてピストンを戻し、シリンジに約 55°Cの湯 20mL を吸い取り、5 分間自然放置した。5 分後にシリンジを手で 90 度 15 往復横転し、崩壊懸濁の状況を観察する。5 分後に崩壊しない場合は、更に 5 分間放置後、同様の操作を行う。それでも崩壊懸濁しない場合は、この方法を中止する。

得られた懸濁液を経管栄養用カテーテル (8Fr.チューブ) の注入端より、約 2~3mL/sec の速度で注入し、通過性を観察する。チューブはベッド上の患者を想定し、体内挿入端から 3 分の 2 を水平にし、他端 (注入端) を 30cm の高さにセットする。注入後に適量の水を注入してチューブ内を洗うとき、チューブ内に残存物が見られなければ、通過性に問題なしとする。

### 水 (約 55°C)

薬品を約 55°Cの温湯 20mL に入れ、5 分または 10 分後に攪拌したときの崩壊状況

#### 【細粒剤】

- 良：溶解またはすぐに懸濁
- やや悪：懸濁しにくい
- 悪：溶解・懸濁せず分散しない

### 2) 判定方法

適 1：10 分以内に崩壊・懸濁し、8Fr.チューブを通過する。

適 2：錠剤のコート剤を破壊、あるいはカプセルを開封すれば、10 分以内に崩壊・懸濁し、8Fr.チューブを通過

不適：簡易懸濁法では経管投与に適さない

### 3) 試験結果

品目	適否	通過サイズ	水(約 55°C)		破壊→水	
			5 分	10 分	5 分	10 分
パルトックス 細粒 20%	適 1※(2)	8Fr		悪		
先発	適 1※(2)	8Fr		悪		

※先発の試験結果に関しては内服薬経管投与ハンドブック - 簡易懸濁法可能医薬品一覧 - より抜粋。

※(2)攪拌しながらカテーテルへ注入した。

### 4) 結論

パルトックス細粒20%について簡易懸濁法の適否を検討した結果、上記条件を満たした場合において8Fr. チューブの通過性に問題はないと判断された。