

くすりのしおり

620501101
2014 年 1 月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。	
商品名：メトクロプラミド錠 5m g 「ツルハラ」 主成分：メトクロプラミド（Metoclopramide） 剤形：白色～微黄白色の錠剤 直径 6.1mm、厚さ 3.0mm シート記載：メトクロプラミド 5m g 「ツルハラ」、5m g、メトクロプラミド、Metoclopramide 5mg、5	
この薬の作用と効果について 中枢の受容体にはたらき、嘔吐を抑える作用を示します。 通常、消化器疾患に伴う悪心・嘔吐などの消化器症状の治療、X 線検査時のバリウム通過促進を目的に用いられます。	
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。副腎の腫瘍（褐色細胞腫）の疑いがある、消化管からの出血、穿孔（穴あき）がある、腸がつまってひどい便秘が続いている（器質的閉塞）。 ・ 妊娠または授乳中 ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。	
用法・用量（この薬の使い方） ・ あなたの用法・用量は ：医療担当者記入 ＜ ・ 通常、成人は 1 日 2～6 錠（塩酸メトクロプラミドとして 10～30mg）を 2～3 回に分け、食前に服用します。年齢、症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。 ・ 飲み忘れた場合は、気がついた時、できるだけ早く 1 回分を飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の通常の服用時間に 1 回分を飲んでください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。 ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。	
生活上の注意 ・ 眠気、めまいが起こることがありますので、車の運転や機械の操作、高所での作業などはさけてください。	
この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 主な副作用として、手指振戦、筋硬直、頸・顔部の攣縮、眼球回転発作、焦燥感、無月経、乳汁分泌、女性型乳房、発疹、浮腫などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 ・ 顔色が青白い、冷汗、立ちくらみ [ショック、アナフィラキシー様症状] ・ 急激な発熱、手足のふるえ、筋肉のこわばり [悪性症候群] ・ 意識が薄れる、考えがまとまらない、判断力が低下する [意識障害] ・ けいれん [痙攣] ・ 口の周りが意思とは関係なく動く、舌を無意識に出し入れする、手足をくりかえし曲げ伸ばしする [遅発性ジスキネジア] 以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。	
保管方法その他 ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。 ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。	
医療担当者記入欄 年 月 日	

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。