

くすりのしおり

2015 年 4 月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。	
商品名： d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ 0.04%「ツルハラ」 主成分： d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 (D-Chlorpheniramine maleate) 剤形： 橙色澄明なシロップ剤 シート記載：	
この薬の作用と効果について アレルギーを起こす物質の働きをおさえ、アレルギー性の鼻炎（くしゃみ、鼻水、鼻づまり）やじんましん、および皮膚疾患に伴うかゆみを改善します。 この薬は病気の原因そのものを治すものではありません。	
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。緑内障、前立腺肥大など下部尿路に閉塞性疾患がある、低出生体重児である。 ・妊娠または授乳中 ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。	
用法・用量（この薬の使い方） ・ あなたの用法・用量は << >> ：医療担当者記入 ・通常、成人は 1 回 5mL（主成分として 2mg）を 1 日 1～4 回服用しますが、治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。 ・アルコールと一緒に服用しないでください。 ・飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は忘れた分は飲まないで 1 回分を飛ばしてください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。 ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。	
生活上の注意 ・眠気が起こることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。 ・相互に作用を増強することがあるので、アルコールと一緒に服用しないでください。	
この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 主な副作用として、眠気、鎮静、口渇、下痢、発疹、光線過敏症、排尿困難、尿閉、頻尿、低血圧、動悸、頻脈、期外収縮（胸部の違和感）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 ・呼吸困難、胸内苦悶、血圧低下〔ショック〕 ・筋肉が発作的に収縮する、考えがまとまらない、時間・場所などがわからない〔痙攣、錯乱〕 ・発熱、貧血症状、出血傾向〔再生不良性貧血、無顆粒球症〕 以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。	
保管方法 その他 ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。 ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。	
医療担当者記入欄	年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。