

くすりのしおり

621215401
2014 年 1 月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。	
商品名：ロキソプロフェンNa錠 60mg「ツルハラ」 主成分：ロキソプロフェンナトリウム水和物（Loxoprofen sodium hydrate） 剤形：うすい紅色の割線入り錠剤、直径 8.0mm、厚さ 3.0mm シート記載：ロキソプロフェン Na60mg「ツルハラ」、ロキソプロフェン Na、60 mg、LoxoprofenNa60mg、60	
この薬の作用と効果について 炎症を引き起こすプロスタグランジンの生合成を抑え、炎症に伴う腫れや痛みをやわらげ、熱を下げます。通常、関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、歯痛、手術後、外傷後、抜歯後の鎮痛・消炎、急性上気道炎の解熱・鎮痛に用いられます。	
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。消化性潰瘍（胃・十二指腸潰瘍）、血液の異常、肝障害、腎障害、心機能不全、アスピリン喘息または既往歴がある。 ・ 妊娠または授乳中 ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。	
用法・用量（この薬の使い方） ・ あなたの用法・用量は ：医療担当者記入 》 ・ <u>関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、歯痛、手術後、外傷後、抜歯後</u>：通常、成人は 1 回 1 錠（主成分無水物として 60mg）を 1 日 3 回服用し、頓用には 1 回 1～2 錠（60～120mg）を服用しますが、治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。 <u>急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</u>：通常、成人は 1 回 1 錠（主成分無水物として 60mg）を頓用します。年齢・症状により適宜増減されますが、原則として 1 日 2 回まで、1 日最大 3 錠（180mg）が限度とされています。 いずれの場合もできるだけ空腹時の服用は避けてください。 ・ 飲み忘れた場合は、気がついた時点で 1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は、忘れた分を飲まないで、次の飲む時間に 1 回分を飲んでください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。 ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。	
生活上の注意	
この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 主な副作用として、発疹、かゆみ、蕁麻疹、発熱、胃部不快感、腹痛、吐き気・嘔吐、消化性潰瘍（腹痛、吐血など）、浮腫、眠気などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 ・ 血圧低下、蕁麻疹、呼吸困難 [ショック、アナフィラキシー様症状] ・ 貧血症状、鼻血・歯ぐきの出血、発熱 [溶血性貧血、白血球減少、血小板減少] ・ 皮膚・粘膜の発赤・発疹・水疱、発熱、全身倦怠感 [皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症] ・ 尿量減少、むくみ、食欲不振 [急性腎不全、ネフローゼ症候群、間質性腎炎] ・ 呼吸困難、全身のむくみ [うっ血性心不全] 以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。	
保管方法その他 ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。 ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局に相談してください。	
医療担当者記入欄 年 月 日	

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。