

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬／利尿薬配合剤
 日本薬局方 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド錠

ロサルヒド® 配合錠LD「ツルハラ」
ロサルヒド® 配合錠HD「ツルハラ」
Losarhyd® LD/HD Tablets「TSURUHARA」

	錠 LD	錠 HD
承認番号	22600AMX 00480000	22800AMX 00323000
薬価収載	2014年6月	2016年6月
販売開始	2014年6月	2016年6月

規 制 区 分	
処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）	
貯 法	室温保存
使用期限	外箱、容器に表示

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

- (1) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- (2) チアジド系薬剤又はその類似化合物（例えばクロルタリドン等のスルホンアミド誘導体）に対する過敏症の既往歴のある患者
- (3) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）
- (4) 重篤な肝機能障害のある患者（「慎重投与」の項参照）
- (5) 無尿の患者又は透析患者
- (6) 急性腎障害の患者〔腎機能を更に悪化させるおそれがある。〕
- (7) 体液中のナトリウム・カリウムが明らかに減少している患者〔低ナトリウム血症、低カリウム血症等の電解質失調を悪化させるおそれがある。〕
- (8) アリスキレンを投与中の糖尿病患者（ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く）〔非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧のリスク増加が報告されている。〕（「重要な基本的注意」の項参照）
- ※ (9) デスマプレシン酢酸塩水和物（男性における夜間多尿による夜間頻尿）を投与中の患者（「相互作用」の項参照）

【組成・性状】

組 成

ロサルヒド配合錠 LD「ツルハラ」は1錠中ロサルタンカリウム 50mg、ヒドロクロロチアジド 12.5mg 及び添加物として結晶セルロース、乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、酸化チタン、タルク、カルナウパロウを含有する。

ロサルヒド配合錠 HD「ツルハラ」は1錠中ロサルタンカリウム 100mg、ヒドロクロロチアジド 12.5mg 及び添加物として結晶セルロース、乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、酸化チタン、タルク、カルナウパロウを含有する。

製剤の性状

ロサルヒド配合錠 LD「ツルハラ」は白色～微黄白色の円形のフィルムコーティング錠で、識別記号は表面 TSU 923、裏面 50 12.5 である。

ロサルヒド配合錠 HD「ツルハラ」は白色～微黄白色の円形のフィルムコーティング錠で、識別記号は表面 TSU924、裏面 100 12.5 である。

			直径：約 8.6mm 厚さ：約 4.1mm 質量：約 260mg
			直径：約 10.1mm 厚さ：約 6.2mm 質量：約 407mg

【効能・効果】

高血圧症

《効能・効果に関連する使用上の注意》

過度な血圧低下のおそれ等があり、本剤を高血圧治療の第一選択薬としないこと。

【用法・用量】

成人には1日1回1錠（ロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジドとして 50mg/12.5mg 又は 100mg/12.5mg）を経口投与する。本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。

《用法・用量に関連する使用上の注意》

原則として、ロサルタンカリウム 50mg で効果不十分な場合にロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジドとして 50mg/12.5mg の投与を、ロサルタンカリウム 100mg 又はロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジドとして 50mg/12.5mg で効果不十分な場合にロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジドとして 100mg/12.5mg の投与を検討すること。

【使用上の注意】

- (1) 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- 1) 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者（「重要な基本的注意」の項参照）
- 2) 腎機能障害患者（「重要な基本的注意」の項参照）
- 3) 血清カリウム値異常の患者（「重要な基本的注意」の項参照）
- 4) 肝機能障害又はその既往のある患者〔外国において、軽・中等度のアルコール性肝硬変患者にロサルタンカリウム 50mg を単回経口投与すると、健康成人と比較してロサルタンの消失速度が遅延し、ロサルタン及びカルボン酸体の血漿中濃度がそれぞれ約5倍及び約2倍に上昇することが報告されている。また、ヒドロクロロチアジドは肝性昏睡を誘発するおそれがある。〕
- 5) 脳血管障害のある患者〔過度の降圧が脳血流不全を惹起し、病態を悪化させるおそれがある。〕
- 6) 体液量が減少している患者〔利尿降圧剤投与中、嚴重な減塩療法中、水分摂取の不十分な患者、過度の発汗をしている患者〕（「重要な基本的注意」の項参照）
- 7) 減塩療法中の患者〔低ナトリウム血症を起こすおそれがある。〕
- 8) 重篤な冠硬化症又は脳動脈硬化症のある患者〔急激な利尿があらわれた場合、急速な血漿量減少、血液濃縮を来し、血栓症を誘発するおそれがある。〕
- 9) 本人又は両親、兄弟に痛風、糖尿病のある患者、及び高尿酸血症のある患者〔高尿酸血症、高血糖症を来し、痛風、糖尿病の悪化や顕性化のおそれがある。〕
- 10) 下痢、嘔吐のある患者〔電解質失調があらわれるおそれがある。〕
- 11) 高カルシウム血症、副甲状腺機能亢進症のある患者〔血清カルシウムを上昇させるおそれがある。〕
- 12) ジギタリス剤、副腎皮質ホルモン剤又は ACTH の投与を受けている患者（「相互作用」の項参照）
- 13) 交感神経切除後の患者〔本剤の降圧作用が増強されるおそれがある。〕
- 14) 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
- 15) 乳児（「小児等への投与」の項参照）

(2) 重要な基本的注意

- 1) 本剤はロサルタンカリウム 50mg あるいは 100mg とヒドロクロロチアジド 12.5mg の配合剤であり、ロサルタンカリウムとヒドロクロロチアジド双方の副作用が発現するおそれがあり、適切に本剤の使用を検討すること。《用法・用量に関連する使用上の注意》の項参照）
- 2) 本剤の投与によって、一過性の血圧低下（ショック症状、意識消失、呼吸困難等を伴う）を起こすおそれがあるので、そのような場合には投与を中止し適切な処置を行うこと。また、本剤投与中は定期的（投与開始時：2週間ごと、安定後：月1回程度）に血圧のモニタリングを実施すること。特に次の患者では患者の状態に十分注意すること。
 1. 利尿降圧剤投与中の患者
 2. 嚴重な減塩療法中の患者
 3. 水分摂取の不十分な患者
 4. 過度の発汗をしている患者
- 3) 血清クレアチニン値が 2.0mg/dL を超える腎機能障害患者においては、ヒドロクロロチアジドにより腎血流量が低下し、ロサルタンカリウムにより腎機能障害が悪化するおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。
- 4) 血清クレアチニン値が 1.5～2.0mg/dL の腎機能低下患者では、血清クレアチニン値上昇及び血清尿酸値上昇のおそれがあるので、本剤投与中は定期的に血清クレアチニン値及び血清尿酸値のモニタリングを実施し、観察を十分に行うこと。
- 5) 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者においては、腎血流量の減少や糸球体過圧の低下により急速に腎機能を悪化させるおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。
- 6) 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドは低カリウム血症を起こすことが知られている。ロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジドとして 50mg/12.5mg が投与された国内臨床試験において、血清カリウム値は低下傾向を示し、また低カリウム血症の発現頻度は高カリウム血症よりも高かった。したがって、低カリウム血症の発現がより懸念されるので、血清カリウム値のモニタリングを定期的に行い、観察を十分に行うこと。

- 7) 本剤の成分であるロサルタンカリウムは高カリウム血症の患者において、高カリウム血症を増悪させるおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。また、腎機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、高カリウム血症が発現するおそれがあるので、血清カリウム値のモニタリングを定期的の実施し、観察を十分に行うこと。
- 8) アリスキレンを併用する場合、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。なお、eGFRが60mL/min/1.73m²未満の腎機能障害のある患者へのアリスキレンとの併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。
- 9) 本剤の成分であるヒドロクロチアジドは高尿酸血症を発現させるおそれがあるので、本剤投与中は定期的に血清尿酸値のモニタリングを実施し、観察を十分に行うこと。
- 10) 本剤の成分であるヒドロクロチアジドは血糖値上昇若しくは糖尿病顕性化のおそれがあるので、観察を十分に行うこと。
- 11) 降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
- 12) 手術前24時間は投与しないことが望ましい。
- 13) 本剤の成分を含むアンジオテンシンII受容体拮抗薬投与中にまれに肝炎等の重篤な肝障害があらわれたとの報告がある。肝機能検査を実施するなど、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- 14) 本剤の投与により利尿効果が急激にあらわれることがあるので、電解質失調、脱水に十分注意すること。
- 15) 夜間の休息が特に必要な患者には、夜間の排尿を避けるため、午前中に投与することが望ましい。

(3) 相互作用

本剤の成分であるロサルタンカリウムは、主に薬物代謝酵素チトクロームP450 2C9 (CYP2C9)により活性代謝物であるカルボン酸体に代謝される。なお、本剤の成分であるヒドロクロチアジドは、ほとんど代謝されることなく尿中に排泄される。

1) 併用禁忌 (併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
※ デスマブレンシ ン酢酸塩水和物 ミニリンメル ト(男性におけ る夜間多尿に よる夜間頻尿)	低ナトリウム血症が発 現するおそれがある。	いずれも低ナトリウム血 症が発現するおそれがあ る。

2) 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カリウム保持性 利尿剤 スピロノラク トン、トリアムテ レン等 カリウム補給剤 塩化カリウム トリメトプリム含 有製剤 スルファメトキサ ゾール・トリメトプ リム	血清カリウム値が上 昇するおそれがある。	本剤の成分であるロサル タンカリウムとの併用に よりカリウム貯留作用が 増強するおそれがある。腎 機能障害のある患者には 特に注意すること。
アリスキレン	腎機能障害、高カリウ ム血症及び低血圧を 起こすおそれがある ため、腎機能、血清カ リウム値及び血圧を 十分に観察すること。 なお、eGFRが60mL /min/1.73m ² 未満の腎 機能障害のある患者 へのアリスキレンと の併用については、治 療上やむを得ないと 判断される場合を除 き避けること。	併用によりレニン・アン ジオテンシン系阻害作用 が増強される可能性があ る。
アンジオテンシ ン変換酵素阻害 剤	腎機能障害、高カリウ ム血症及び低血圧を 起こすおそれがある ため、腎機能、血清カ リウム値及び血圧を 十分に観察すること。	併用によりレニン・アン ジオテンシン系阻害作用 が増強される可能性があ る。
バルビツール酸 誘導体	起立性低血圧が増強 されることがある。	これらの薬剤の中樞抑制 作用と本剤の成分である ヒドロクロチアジドの 降圧作用による。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
あへんアルカロ イド系麻薬	起立性低血圧が増強 されることがある。	本剤の成分であるヒドロ クロチアジドとあへん アルカロイドの大量投与 で血圧下降があらわれ ることが報告されている。
アルコール	起立性低血圧が増強 されることがある。	本剤の成分であるヒドロ クロチアジドと血管拡 張作用を有するアルコ ールとの併用により降 圧作用が増強される可 能性がある。
昇圧アミン ノルアドレナ リン アドレナリン	昇圧アミンの作用を 減弱することがあ る。手術前の患者に 使用する場合は、本 剤の一時休業等の処 置を講ずること。	本剤の成分であるヒドロ クロチアジドは昇圧ア ミンに対する血管壁の 反応性を低下させるこ とが報告されている。
ツボクラリン及 びその類似作用 物質 ツボクラリン 塩化物塩酸塩 水和物 パンクロニウ ム臭化物	ツボクラリン及びそ の類似作用物質の麻 痺作用を増強するこ とがある。手術前の患 者に使用する場合は、 本剤の一時休業等の 処置を講ずること。	本剤の成分であるヒドロ クロチアジドによる血 清カリウム値の低下に よるこれらの薬剤の神 経・筋遮断作用を増強 すると考えられている。
降圧作用を有す る他の薬剤 β-遮断剤 ニトログリセ リン等	降圧作用を増強する おそれがある。 降圧剤の用量調節等 に注意すること。	作用機序の異なる降 圧作用により互いに協 力的に作用する。
ジギタリス剤 ジゴキシン ジギトキシン	ジギタリスの心臓に 対する作用を増強 し、不整脈等を起こ すことがある。血清 カリウム値に十分注 意すること。	本剤の成分であるヒドロ クロチアジドによる血 清カリウム値の低下に よる多量のジギタリス が心筋Na-K ATPase に結合し、心収縮力増 強と不整脈がおこる。 マグネシウム低下も 同様の作用を示す。
乳酸ナトリウム	チアジド系薬剤によ く代謝性アルカロー シス、低カリウム血 症を増強することが ある。	本剤の成分であるヒドロ クロチアジドのカリウ ム排泄作用により低カ リウム血症や代謝性アル カローシスが引き起こ されることがある。アル カリ化剤である乳酸ナ トリウムの併用はこの 状態を更に増強させ る。
リチウム 炭酸リチウム	リチウム中毒が報告 されているので、血 中リチウム濃度に注 意すること。 振戦、消化器愁訴等、 リチウム中毒を増強 することがある。血 清リチウム濃度に注 意すること。	本剤の成分であるロサ ルタンカリウムのナト リウム排泄作用により 、リチウムの蓄積が おこると考えられて いる。 本剤の成分であるヒ ドロクロチアジドは 腎におけるリチウ ムの再吸収を促進 し、リチウムの血中 濃度を上昇させる。
副腎皮質ホルモ ン剤 ACTH	低カリウム血症が発 現することがある。	本剤の成分であるヒ ドロクロチアジド及 び副腎皮質ホルモ ン剤、ACTHとも カリウム排泄作用 を持つ。
グリチルリチン 製剤	血清カリウム値の低 下があらわれやす くなる。	グリチルリチン製剤 は低カリウム血症を 主徴とした偽アル ドステロン症を引 き起こすことがあ る。したがって本 剤の成分であるヒ ドロクロチアジド とグリチルリチン 製剤の併用により 低カリウム血症を 増強する可能性が ある。
糖尿病用剤 SU剤 インスリン	糖尿病用剤の作用を 著しく減弱するこ とがある。	機序は明確ではない が、本剤の成分 であるヒドロクロ チアジドによるカ リウム喪失により 膵臓のβ細胞の インスリン放出 が低下すると考 えられている。
コレステラミン	チアジド系薬剤の 作用が減弱するこ とがある。	コレステラミンの 吸着作用により 本剤の成分であ るヒドロクロチ アジドの吸収が 阻害されることが ある。
非ステロイド性 消炎鎮痛剤 インドメタシ ン等	本剤の降圧作用が 減弱されるおそれ がある。	プロスタグランジ ンの合成阻害作用 により、本剤の 降圧作用を減弱 させる可能性が ある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
非ステロイド性消炎鎮痛剤 インドメタシン等	腎機能が悪化している患者では、さらに腎機能が悪化するおそれがある。 チアジド系薬剤の作用が減弱することがある。	プロスタグランジンの合成阻害作用により、腎血流量が低下するためと考えられる。 非ステロイド性消炎鎮痛剤のプロスタグランジン合成酵素阻害作用により、腎内プロスタグランジンが減少し、水・ナトリウムの体内貯留が生じて本剤の成分であるヒドロクロロチアジドの作用と拮抗する。
スルフィンピラゾン	チアジド系薬剤はスルフィンピラゾンの尿酸排泄作用に拮抗することがある。	チアジド系利尿剤は、腎での尿酸分泌の阻害、尿酸再吸収の増大作用を有すると考えられ、スルフィンピラゾンの尿酸排泄作用に拮抗することがある。

(4) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

1) 重大な副作用(頻度不明)

次のような副作用があらわれることがあるので、症状があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

- アナフィラキシー**：不快感、口内異常感、発汗、蕁麻疹、呼吸困難、全身潮紅、浮腫等が症状としてあらわれることがあるので観察を十分に行うこと。
- 血管浮腫**：顔面、口唇、咽頭、舌等の腫脹が症状としてあらわれることがあるので観察を十分に行うこと。
- 急性肝炎又は劇症肝炎**
- 急性腎障害**：急性腎障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
- ショック、失神、意識消失**：ショック、血圧低下に伴う失神、意識消失があらわれることがあるので、観察を十分に行い、冷感、嘔吐、意識消失等があらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。特に厳重な減塩療法中、利尿降圧剤投与中の患者では、患者の状態を十分に観察すること。
- 横紋筋融解症**：筋肉痛、脱力感、CK (CPK) 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。
- 低カリウム血症、高カリウム血症**：重篤な低カリウム血症、高カリウム血症があらわれることがあり、血清カリウム値の異常変動に伴い、倦怠感、脱力感、不整脈等が発現するおそれがあるため、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど、直ちに適切な処置を行うこと。
- 不整脈**：心室性期外収縮、心房細動等の不整脈があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
- 汎血球減少、白血球減少、血小板減少**：汎血球減少、白血球減少、血小板減少があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
- 再生不良性貧血、溶血性貧血**：重篤な血液障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
- 壊死性血管炎**
- 間質性肺炎、肺水腫**
- 全身性エリテマトーデスの悪化**
- 低血糖**：低血糖があらわれることがある(糖尿病治療中の患者であらわれやすい)ので、観察を十分に行い、脱力感、空腹感、冷汗、手の震え、集中力低下、痙攣、意識障害等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 低ナトリウム血症**：倦怠感、食欲不振、嘔気、嘔吐、意識障害等を伴う低ナトリウム血症があらわれることがある(高齢者であらわれやすい)ので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、直ちに適切な処置を行うこと。
- 急性近視、閉塞隅角緑内障**：急性近視(霧視、視力低下等を含む)、閉塞隅角緑内障があらわれることがあるので、急激な視力の低下や眼痛等の異常が認められた場合には投与を中止し、速やかに眼科医の診察を受けるよう、患者に指導すること。

2) その他の副作用

次のような症状又は異常があらわれた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

	頻度不明
精神神経系	めまい、浮遊感、頭痛、耳鳴、不眠、眠気、知覚異常
循環器系	低血圧、起立性低血圧、調律障害(頻脈等)、胸痛、動悸

	頻度不明
消化器	嘔吐・嘔気、口内炎、下痢、便秘、口渇、腹部不快感、口角炎、胃不快感、胃潰瘍、腹部仙痛、膵炎、唾液腺炎、食欲不振
肝臓	黄疸、肝機能障害(AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、LDH 上昇等)
腎臓	BUN 上昇、クレアチニン上昇
皮膚	発疹、光線過敏、紅斑、痒疹、蕁麻疹、多形紅斑、紅皮症、顔面潮紅、皮膚エリテマトーデス
血液	貧血、赤血球数減少、ヘマトクリット低下、白血球数増加、赤血球数増加、ヘマトクリット上昇、ヘモグロビン増加、好中球百分率増加、リンパ球数増加、リンパ球数減少、好酸球数増加
その他	倦怠感、浮腫、CK(CPK)上昇、高尿酸血症、高血糖症、頻尿、CRP 増加、尿中ブドウ糖陽性、味覚障害、しびれ感、眼症状(かすみ、異和感等)、ほてり、筋痙攣、紫斑、頸部異和感、多汗、呼吸困難、血清脂質増加、尿中赤血球陽性、尿中蛋白陽性、尿中白血球陽性、BNP 増加、発熱、黄視症、筋肉痛、咳嗽、低マグネシウム血症、低カルシウム血症、血清カルシウム増加、インポテンス、高カルシウム血症を伴う副甲状腺障害、関節痛、鼻閉、女性化乳房

(5) 高齢者への投与

高齢者には、次の点に注意し、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

- 高齢者では一般に過度の降圧は好ましくないとされている。〔脳梗塞等が起こるおそれがある。〕
- 高齢者でのロサルタンカリウム単独投与における薬物動態試験で、ロサルタン及びカルボン酸体の血漿中濃度が非高齢者に比べて高くなることが認められている。〔非高齢者に比較してロサルタン及びカルボン酸体の血漿中濃度がそれぞれ約 2 倍及び約 1.3 倍に上昇〕
- 高齢者では、急激な利尿は血漿量の減少を来し、脱水、低血圧等による立ちくらみ、めまい、失神等を起こすことがある。
- 特に心疾患等で浮腫のある高齢者では急激な利尿は急速な血漿量の減少と血液濃縮を来し、脳梗塞等の血栓塞栓症を誘発するおそれがある。
- 高齢者では低ナトリウム血症、低カリウム血症があらわれやすい。

(6) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。また、投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。〔妊娠中期及び末期に本剤の成分を含むアンジオテンシン II 受容体拮抗剤を投与された高血圧症の患者で羊水過少症、胎児・新生児の死亡、新生児の低血圧、腎不全、多臓器不全、頭蓋の形成不全及び羊水過少症によると推測される四肢の奇形、頭蓋顔面の奇形、肺の発育不全等があらわれたとの報告がある。〕
- 本剤投与中は授乳を中止させること。
(参考) ラットの周産期及び授乳期にロサルタンカリウム 1mg/kg/day・ヒドロクロロチアジド 0.25mg/kg/day～ロサルタンカリウム 50mg/kg/day・ヒドロクロロチアジド 12.5mg/kg/day を投与した試験において、ロサルタンカリウム 50mg/kg/day・ヒドロクロロチアジド 12.5mg/kg/day 群で産児体重の減少及び腎の病理組織学的変化がみられた。また、ロサルタン、カルボン酸体及びヒドロクロロチアジドの乳汁移行性も確認された。本試験の産児に対する無毒性量はロサルタンカリウム 10mg/kg/day・ヒドロクロロチアジド 2.5mg/kg/day であった。

(7) 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。(使用経験がない)

(8) 臨床検査結果に及ぼす影響

甲状腺障害のない患者の血清 PBI を低下させることがあるので注意すること。

(9) 適用上の注意

薬剤交付時：PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。〔PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕

※※(10) その他の注意

海外で実施された疫学研究において、ヒドロクロロチアジドを投与された患者で、基底細胞癌及び有棘細胞癌のリスクが増加することが報告されている^{1) 2)}。

【薬物動態】

(1) 生物学的同等性試験


ロサルヒド配合錠 LD「ツルハラ」を標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠〔ロサルタン 50mg、ヒドロクロロチアジド 12.5mg〕を健康成人男子に絶食時単回経口投与してそれぞれの血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、Cmax) について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.8) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された³⁾。

また、ロサルヒド配合錠 **LD**「ツルハラ」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン（平成 24 年 2 月 29 日薬食審査発 0229 第 10 号）」に基づき、ロサルヒド配合錠 **LD**「ツルハラ」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた⁴⁾。

ロサルタンカリウム

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₈ (ng・hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
ロサルヒド配合錠 LD「ツルハラ」	466.1±31.6	291.9±38.8	1.5±0.2	2.1±0.1
標準製剤	459.9±26.5	257.2±20.3	1.4±0.2	1.9±0.1


(mean±S.E., n=24)



ヒドロクロロチアジド

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₂₄ (ng・hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
ロサルヒド配合錠 LD「ツルハラ」	611.5±20.0	90.3±4.6	2.4±0.2	7.2±0.2
標準製剤	602.1±18.5	97.7±5.5	2.3±0.2	7.0±0.2

(mean±S.E., n=24)



血漿中濃度並びに AUC、C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(2) 溶出挙動

ロサルヒド配合錠 **LD**「ツルハラ」⁵⁾、ロサルヒド配合錠 **HD**「ツルハラ」⁶⁾ は日本薬局方医薬品各条に定められたロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド錠の溶出規格に適合していることが確認されている。


【薬効薬理】

本剤はロサルタンカリウムとヒドロクロロチアジドの配合剤である。ロサルタンカリウムは、アンジオテンシンⅡ受容体のうち AT₁ 受容体と選択的に結合し、アンジオテンシンⅡの生理作用を阻害することによって降圧作用を現す。本薬の主代謝物のカルボン酸体も本薬と同様の作用を示す。なお、ブラジキニンの分解酵素（キニナーゼⅡ）には直接作用しない⁷⁾。一方の配合成分であるヒドロクロロチアジドは、チアジド系利尿薬で、腎遠位尿細管における Na⁺と Cl⁻の再吸収を抑制し、水の排泄を促進させる。炭酸脱水酵素阻害作用も有する。降圧作用は、初期には循環血流量の低下により、長期的には末梢血管の拡張によると考えられている⁸⁾。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：ロサルタンカリウム (Losartan Potassium)

構造式：



化学名：Monopotassium 5-[[4-(2-butyl-4-chloro-5-hydroxy-methyl-1H-imidazol-1-yl) methyl] biphenyl-2-yl]-1H-tetrazol-1-ide


分子式：C₂₂H₂₂ClKN₆O

分子量：461.00

性状：白色の結晶性の粉末である。
水に極めて溶けやすく、メタノール又はエタノール(99.5)に溶けやすい。

一般名：ヒドロクロロチアジド (Hydrochlorothiazide)

構造式：



化学名：6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide

分子式：C₇H₈ClN₃O₄S₂

分子量：297.74

融点：約 267°C (分解)

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、味はわずかに苦い。
アセトンに溶けやすく、アセトニトリルにやや溶けにくく、水又はエタノール(95)に極めて溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。水酸化ナトリウム試液に溶ける。

【取扱い上の注意】

安定性試験

最終包装製品を用いた加速試験（40°C、相対湿度 75%、6 ヶ月）の結果、ロサルヒド配合錠 **LD**「ツルハラ」⁹⁾、ロサルヒド配合錠 **HD**「ツルハラ」¹⁰⁾ は通常の市場流通下において 3 年間安定であることが推測された。

【包装】

錠 **LD**：(PTP) 100 錠、1000 錠

錠 **HD**：(PTP) 100 錠、500 錠

【主要文献】

- ※※1) Pottegard, A. et al. : J. Intern. Med. 282, 322-331(2017)
- ※※2) Pedersen, SA. et al. J. Am. Acad. Dermatol. 78,673-681(2018)
- 3) 鶴原製薬株式会社 社内資料
- 4) 鶴原製薬株式会社 社内資料
- 5) 鶴原製薬株式会社 社内資料
- 6) 鶴原製薬株式会社 社内資料
- ※7) 第十七改正日本薬局方解説書（廣川書店）C-6013（2016）
- ※8) 第十七改正日本薬局方解説書（廣川書店）C-4141（2016）
- 9) 鶴原製薬株式会社 社内資料
- 10) 鶴原製薬株式会社 社内資料

【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料についても下記へご請求ください。

鶴原製薬株式会社 医薬情報部

〒563-0036 大阪府池田市豊島北 1 丁目 1 6 番 1 号

TEL：072-761-1456 (代表) FAX：072-760-5252



製造販売元
鶴原製薬株式会社

大阪府池田市豊島北 1 丁目 1 6 番 1 号

(L8)
(L9)-6 6-2002
A002-S